41 mm | 90 mm | 25 mm | 260 mm | 25 mm | 95 mm | 40 mm

15 mm | 60 mm | 275 mm | 45 mm | 35 mm

430 mm

N_025 - worek 5 kg

Wymagania roślin względem odczynu/kwasowości gleby	
odczyn gleby – pH	**Rośliny/grupy roślin**
bardzo kwaśny pH poniżej 5,0	borówki wysokie, żurawiny, różaneczniki, azalie, hortensje niebieskie, wrzosy, wrzośce, kamelie
kwaśny pH 5,1–6,0	truskawki, maliny, agrest, aronia, pomidory, papryka, pelargonie, konwalie, modrzewie, świerki, sosny
obojętny/lekko kwaśny pH 6,1–7,4	pozostałe rośliny

TERMINY STOSOWANIA

Jesień

to najlepszy termin stosowania nawozu (wrzesień – październik) – po zbiorze plonów. Zalecaną dawkę należy rozsiać równomiernie na nawożoną powierzchnię i zmieszać dokładnie z uprawną warstwą gleby.

Wiosna

przed siewem lub sadzeniem roślin (jak najwcześniej wiosną) całą zalecaną dawkę rozsiać równomiernie na nawożoną powierzchnię i zmieszać dokładnie z uprawną warstwą gleby.

Wskazówki

- Nawóz należy stosować co najmniej 2–3 tygodnie przed zastosowaniem innych nawozów.
- Bezpośrednio po wapnowaniu nie należy siać ani sadzić roślin.
- Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.
- Nie należy stosować nawozu pod rośliny kwaśnolubne.
- Wapnowanie gleby pod uprawę takich warzyw jak: dynia, fasola, groch, marchew, ogórek, pasternak, pietruszka, pomidor, seler należy przeprowadzać najpóźniej jesienią w roku poprzedzającym uprawę.

Florovit dolomit mielony

ŚRODEK WAPNUJĄCY PFC 2
Liczba zobojętnienia: min. 48 (ekwiwalent CaO)
Całkowity tlenek wapnia (CaO): 26% (m/m)
Całkowity tlenek magnezu (MgO): 17% (m/m)
Reaktywność: 50% (test kwasu chlorowodorowego)
Składniki: dolomit[1] (CAS 14168-73-1), gdzie [1] oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny.
Granulometria: Proszek. 90% produktu przechodzi przez sito 1 mm.
Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Rozsypany nawóz dokładnie zebrać, pozostałość zmyć wodą. W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania.

CE

PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM POMIESZCZENIU W ORYGINALNYCH ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH. Data ważności - bezterminowo.

90098vCE01

5 900498 002591

GRUPA INCO

GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax +48 55 242 75 00
florovit.pl

13 12 | 11 10 | 4 LDPE

masa netto 5 kg

florovit®

Florovit dolomit mielony to nawóz wapniowo-magnezowy przeznaczony do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach ubogich w magnez. Dolomit odkwasza podłoże, wnosi do gleby magnez i mikroelementy oraz poprawia jakość plonów. Magnez ułatwia roślinom pobieranie fosforu i korzystnie wpływa na szereg procesów metabolicznych. Z uwagi na duży stopień rozdrobnienia szybko przenika do roztworu glebowego i jest łatwo przyswajalny przez rośliny.

Dolomit odkwasza glebę przez co podnosi jej urodzajność:

- poprawia strukturę gleby,
- zwiększa przyswajalność składników pokarmowych,
- ogranicza przyswajanie przez rośliny metali ciężkich,
- poprawia jakość plonów,
- przeciwdziała chlorozie.

SPOSÓB STOSOWANIA

Dawki stosowania

Stosować w dawce 0,8–2,1 kg na 10 m² w zależności od odczynu gleby oraz jej zasobności w magnez wg tabeli.

Pełna szklanka zawiera ok. 330 g nawozu.

Zalecane dawki w kg/10 m²

Zawartość magnezu w glebie	Przygotowanie stanowiska pod rośliny jednoroczne na glebach				Rośliny wieloletnie	Trawniki
	bardzo lekkich	lekkich	średnich	ciężkich		
bardzo niska	1,0	1,3	1,6	2,1	1,6	1,6
niska	0,8	1,0	1,3	1,8	1,0	1,0

Zalecane dawki nawozu mogą nie regulować w pełni odczynu gleby, na której wapnowanie jest konieczne. W przypadku utrzymania się kwaśnego odczynu należy dodatkowo zwapnować glebę w ilościach wynikających z pH gleby.

46 mm | 8 mm | 45 mm | 8 mm

576 mm