

SPOSÓB STOSOWANIA

Róże

Przygotowanie podłoża – podczas sadzenia ziemię z dolka lub specjalne podłoże ogrodnicze zmieszać z około 20 g nawozu, obficie podlać. Stosować od wiosny do połowy sierpnia w odstępach 4 tygodniowych w dawkach wg tabeli. Korzystnie jest lekko zmieszać nawóz z wierzchnią warstwą gleby. Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.

Rodzaj nasadzeń	Rośliny młode	Rośliny starsze
Rosnące pojedynczo	15–25 g/roślinę	30–50 g/roślinę
Rosnące w grupach	10–20 g/roślinę	20–40 g/roślinę
Nasadzenia zwrarte (rabaty kwiatowe)	50–80 g/m ²	70–100 g/m ²

Krzewy kwitnące

Budleja, forsycja, glicynia, hortensja, jaśmin, kalina, krzewuska, lilak, magnolia, milin, porzeczka ozdobna i krwista, powojnik, tawuła itp.

Nowe nasadzenia

Wiosną (połowa kwietnia) podczas sadzenia – ziemię z dolka lub specjalne podłoże ogrodnicze zmieszać z około 20 g nawozu, tak uzyskany podłoże obsypać korzenie rośliny, obficie podlać. Następnie nawozić 3-krotnie (zachowując miesięczne odstępy), stosując łącznie w sezonie 60–160 g nawozu na 1 m² (w zależności od wieku i wymagań pokarmowych rośliny), w następujących terminach i dawkach:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

- połowa maja **40–80 g/m²**
- połowa czerwca **10–20 g/m²**
- połowa lipca **10–20 g/m²**

Stare nasadzenia

Dokarmianie roślin już rosnących (nawożenie pogłównie) należy przeprowadzać 4-krotnie, stosując łącznie w sezonie 120–190 g nawozu na 1 m², w następujących terminach i dawkach:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

- wczesna wiosna **40–60 g/m²**
- połowa maja **40–60 g/m²**
- połowa czerwca **20–35 g/m²**
- połowa lipca **20–35 g/m²**

Byliny oraz rośliny wieloletnie

Bodziszek, bratek, ciemiernik, cyklamen, dalia, fiołek, floks, funkia, goździk, irys, konwalia, lawenda, lilia, macierzanka, malwa, orlik, piwonia, rozchodnik, sasanka, stokrotka itp.

Rośliny należy nawozić 4-krotnie, stosując łącznie w sezonie 270–330 g nawozu na 1 m², w następujących terminach i dawkach:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

- wczesna wiosna **80–100 g/m²**
- połowa maja **80–100 g/m²**
- połowa czerwca **60–70 g/m²**
- połowa lipca **50–60 g/m²**

Rośliny rabatowe uprawiane w gruncie

Aksamitka, aster, chaber, cynia, lewkonía, maciejka, nasturcja, pelargonía, szawia, szarłat itp.

Wiosną, w czasie przygotowywania gleby (przed sadzeniem roślin), należy jednorazowo zastosować 150–200 g nawozu na 1 m². Granulat należy równomiernie rozsiać na nawozonej powierzchni, po czym zmieszać z wierzchnią warstwą gleby o miąższości 10–20 cm. W przypadku roślin kwitnących latem zabieg można powtórzyć pod koniec maja, stosując 70–100 g nawozu na 1 m².

Nawóz może być używany z dobrym skutkiem wczesną wiosną przed siewem lub sadzeniem (przedwegetacyjnie), jak również do dokarmiania roślin już rosnących (pogłównie). W przypadku nawożenia pogłównego należy unikać rozsywu nawozu na mokre rośliny oraz w miarę możliwości zmieszać nawóz z wierzchnią warstwą gleby, tak aby nie uszkodzić korzeni.

Nawożenie należy zakończyć najpóźniej do połowy sierpnia.

Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Podane dawki produktu są zaleceniami.

5 kg

nawet na
335
roślin

nawóz do róż i innych roślin kwitnących

PIĘKNE BUJNE KWIATY DŁUGIE KWITNIENIE

5 kg

FruktoVit
PLUS DLA TWOJEGO OGRODU

nawóz do róż i innych roślin kwitnących

- **krzewy kwitnące**
- **byliny i rośliny wieloletnie**
- **rośliny rabatowe**

Nawóz zawiera składniki pokarmowe w ilościach i formach szczególnie dostosowanych do wymagań pokarmowych wszystkich gatunków róż i innych roślin kwitnących.

FruktoVit PLUS może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, zarówno dla nowych nasadzeń, jak również do dokarmiania roślin już rosnących (nawożenie pogłównie).

Regularne stosowanie nawozu zapewnia:



Pełna szklanka **~260 g** nawozu
Łyżka stołowa **~17 g** nawozu

FruktoVit Plus nawóz do róż i innych roślin kwitnących

NAWÓZ MINERALNY (PFC 1(C)(I)(a)(ii))
Nawóz kompleksowy NPK 8,0-6,0-7,8 / 8,0-2,6-6,5 z mikroskładnikami

SKŁAD NAWOZU:

8,0% AZOT CAŁKOWITY (N); 8,0% azot mocznikowy; 6,0% CAŁKOWITY PIĘCIO-TLENEK FOSFORU (P₂O₅); 3,2% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrońkowym; 7,8% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K₂O); 0,18% żelazo (Fe), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,10% mangan (Mn), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie.

SKŁADNIKI: dolomit¹ (CAS 16389-88-1), fosforyt miękki¹ (CAS 1306-05-4), mocznik¹ (CAS 57-13-6), siarczan (VI) dipotasu¹¹ (CAS 7778-80-5), gdzie ¹ oznacza CMC¹ – surowce pierwotne i mieszaniny, ¹¹ oznacza CMC 11 – produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.

Granulometria: Granule. 85% produktu przechodzi przez sito 5 mm.

Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEK/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Rozsypany nawóz dokładnie zebrać, pozostałość zmyć wodą. W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. Nawóz może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. Należy stosować w umiarkowanej temperaturze otoczenia.

PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM POMIESZCZENIU W ORYGINALNYCH ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH. Data ważności na opakowaniu.

90391vCE01
5 900498 029598
GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax +48 55 242 75 00
fruktovit.pl



masa netto 5 kg