

44 mm

75 mm

florovit®



na 80 litrów
roztworu

prawidłowy
wzrost

piękny
wygląd

80263v CE01

nawóz do
bonsai



nawóz płynny
do bonsai


SPOSÓB UŻYCIA: Stosować 2,5 ml (pół łyżeczki) nawozu na 1 l wody. Podlewać rośliny od kwietnia do października. W zależności od wymagań gatunku nawozić co 2, 4 lub 6 tygodni. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.



UWAGA

UFI:38GS-S1QQ-W00Y-964X

5 900498 007930



l80392vCE01

CE

0,25 kg

masa netto



GRUPA
INCO

GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu – tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl



Florovit nawóz płynny do bonsai

PŁYNNY NAWÓZ MINERALNY (PFC 1 (C)(I)(b)(ii))

Nawóz NPK 5-5-5/5-2,1-4,1 z mikroskładnikami

SKŁAD NAWOZU:

5% AZOT CAŁKOWITY (N); 0,4% azot azotanowy; 4,6% azot mocznikowy; 5% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5); 5,0% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5); 5% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K_2O). Mikroskładniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie: 0,02% bor (B), jako kwas; 0,002% miedź (Cu), jako siarczan; 0,002% schelatowana przez EDTA; 0,02% żelazo (Fe), jako siarczan; 0,02% schelatowane przez EDTA; 0,015% mangan (Mn), jako siarczan; 0,015% schelatowany przez EDTA; 0,002% molibden (Mo), jako molibdenian amonu; 0,015% cynk (Zn), jako siarczan; 0,015% schelatowany przez EDTA. Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3–7.

Składniki: mocznik¹ (CAS 57-13-6), azotan potasu¹ (CAS 7757-79-1), wodorooortofosforan dipotasu¹ (CAS 7758-11-4), diwodorooortofosforan potasu¹ (CAS 7778-77-0), gdzie ¹ oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny. Nawóz płynny w postaci roztworu.

Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.



Florovit nawóz płynny do bonsai

UWAGA. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawiera oktylinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. W przypadku rozlania spłukać dużą ilością wody. Nawóz może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. Należy stosować w umiarkowanej temperaturze otoczenia. Chronić przed mrozem i nagrzaniem, przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temp. 5–40°C.

Data ważności na opakowaniu.

UFI:38GS-S1QQ-W00Y-964X



0,25 kg
masa netto



GRUPA INCO S.A., ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu – tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl