41 mm | 90 mm | 25 mm | 260 mm | 25 mm | 95 mm | 40 mm

15 mm

60 mm

470 mm

315 mm

45mm

35 mm

N_033 - worek 5 kg

Pielęgnacja trawników istniejących

Zabieg wapnowania należy wykonać co najmniej 3-4 tygodnie przed zastosowaniem innych nawozów. Dawki wapna należy ustalać w zależności od odczynu i rodzaju gleby (patrz tabelka).

Optymalne wyniki uzyskasz stosując Florovit wapno do trawników wczesną wiosną (marzec) lub jesienią (koniec września–początek listopada). W razie potrzeby wapnowanie małymi dawkami (1/2 zalecanej dawki) można przeprowadzać miejscowo przez cały rok.

W przypadku trawników wielkopowierzchniowych (pow. 500 m²) zabieg można przeprowadzać miejscowo, ograniczając aplikację do powierzchni, na których występuje mech.

Trawniki na glebach lekkich, piaszczystych należy wapnować częściej niż na glebach ciężkich, zwięzłych.

Zabieg wapnowania powtarzać w zależności od odczynu gleby. W razie ponownego wystąpienia mchu na trawniku – zabieg powtórzyć miejscowo. Zaleca się okresowe wykonywanie pomiarów pH podłoża (kwasowości gleby) i ustalanie dawki wapna na podstawie uzyskanych wyników.

UWAGA

Nie należy stosować wapna pod rośliny kwaśnolubne. Wapnowanie trawników przeprowadza się nie częściej niż co 3–4 lata.

Florovit wapno nawozowe do trawników

ŚRODEK WAPNUJĄCY PFC 2
Liczba zobojętnienia: min. 50 (ekwiwalent CaO)
Całkowity tlenek wapnia (CaO): 50% (m/m)
Reaktywność: 100% (test kwasu chlorowodorowego)
Składniki: węglan wapnia[1] (CAS 1317-65-3), gdzie [1] oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny.
Granulometria: Granule. 90% produktu przechodzi przez sito 5 mm.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Rozsypany nawóz dokładnie zebrać, pozostałość zmyć wodą. W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania

CE PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM POMIESZCZENIU W ORYGINALNYCH ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH.

Data ważności – bezterminowo

Zakwalifikowany przez IUNG w Puławach do stosowania w rolnictwie ekologicznym: NE/231/2013.

90284vCE01
5 900498 015751

GRUPA INCO

GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25,
00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl

13 12 | 11 10 | 4 LDPE

masa netto 5 kg

granulat

florovit®

skutecznie odkwasza glebę

na ok. 50 m²

szybko przenika i odkwasza glebę

wspomaga odporność trawnika na mech

wapno nawozowe do trawników

5 kg

granulat

florovit®

Florovit wapno do trawników:

- odkwasza glebę
- zapewnia lepsze warunki wzrostu i rozwoju trawy
- szybko rozpada się pod wpływem wody
- 100% naturalny produkt ekologiczny

Florovit wapno do trawników przeznaczone jest do nawożenia wszystkich rodzajów trawników, zarówno ozdobnych, jak i intensywnie użytkowanych. Zabieg wapnowania doprowadza do optymalnego dla roślin odczynu podłoża (odkwasza glebę), ułatwia roślinom pobieranie innych składników pokarmowych oraz korzystnie wpływa na rozwój pożytecznej mikroflory glebowej. Obniżanie się odczynu gleby (zakwaszanie) jest procesem naturalnym. Charakterystyczne objawy braku wapnia w trawnikach to wiotkie, rzadkie źdźbła oraz opanowanie murawy przez mech. Florovit wapno do trawników odkwasza glebę i wnosi do niej ważny składnik pokarmowy, jakim jest wapń. Produkt można z powodzeniem stosować zarówno do zakładania trawników, jak i do trawników wieloletnich.

SPOSÓB STOSOWANIA

Dawki wapna powinny być ustalane w zależności od odczynu i rodzaju gleby wg tabeli.

Dawki wapna w kg/10 m²

Odczyn gleby/ Rodzaj gleby	Lekkie gleby piaszczyste	Gleby średnio żyzne piaszczysto-gliniaste	Ciężkie gleby gliniaste
Bardzo kwaśny (pH poniżej 4,5)	4–5	5–6	6–7
Kwaśny (pH 4,6–5,5)	2–3	3–4	4–5
Lekko kwaśny (pH 5,6–6,5)	0,5–1	1–1,5	1–2

Zakładanie trawnika (siew lub trawnik z rolki)

Wapnowanie podłoża przed założeniem trawnika ma na celu doprowadzenie do uzyskania pH gleby na poziomie 6,0-7,0. Zabieg wapnowania należy wykonać co najmniej 3-4 tygodnie przed planowanym wysiewem nasion lub przed wyłożeniem rolek trawy oraz przed zastosowaniem innych nawozów. Dawki wapna należy ustalać w zależności od odczynu i rodzaju gleby (patrz tabelka). Wapno należy rozsypać równomiernie na całej nawożonej powierzchni oraz zmieszać z wierzchnią warstwą gleby o miąższości 10-20 cm.

46 mm | 8 mm | 45 mm | 8 mm

576 mm