

333 216

Florovit nawóz do borówek i innych roślin kwaśnolubnych

Nawóz MINERALNY (PFC 1(C)(i)(a)(ii))
Nawóz kompleksowy NPK 12,0-6,0-13,0 (2,6) / 12,0-2,6-10,8 (1,5) z mikroskładnikami
SKŁAD NAWOZU: 12,0% AZOT CAŁKOWITY (N); 12,0% azot amonowy; 6,0% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5); 3,9% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5); 6,0% pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu; 13,0% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K₂O); 2,6% CAŁKOWITY TLENEK MAGNEZU (MgO); 2,6% rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu (MgO); 0,05% bor (B), jako kwas, rozpuszczalny w wodzie; 0,100% miedź (Cu), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,50% żelazo (Fe), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,27% mangan (Mn), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,005% molibden (Mo), jako molibdenian amonu, rozpuszczalny w wodzie; 0,040% cynk (Zn), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie.

Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.

Niska zawartość chlorków.

Składniki: siarczan (VI) amonu¹¹ (CAS 7783-20-2), siarczan (VI) dipotasu¹ (CAS 7778-80-5), fosforan amonu¹ (CAS 7783-28-0), siarczan (VI) magnezu¹ (CAS 7487-88-9), gdzie ¹ oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny, ¹¹ oznacza CMC 11 – produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.

Granulometria: Granule. 90% produktu przechodzi przez sito 5 mm.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekazem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Rozsypany nawóz dokładnie zebrać, pozostałość zmyć wodą. W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania.



PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM POMIESZCZENIU W ORYGINALNYCH ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH.
Data ważności na opakowaniu.



GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax +48 55 242 75 00
florovit.pl



5 900498 101039 8



masa netto 1 kg

Nawóz do borówek i innych roślin kwaśnolubnych

mikrogranulat

florovit®



wystarcza nawet na 50 m²

prawidłowy wzrost, obfite plony

duże, smaczne owoce

Nawóz do borówek i innych roślin kwaśnolubnych

1 kg

50086vCE01

Wypróbuj!
Inne nawozy Florovit:



do truskawek



do winorośli



Ogród Complex


Florovit nr 1 – najbardziej znana w Polsce marka nawozów do roślin.
Badanie Millward Brown 2018

mikrogranulat

florovit®

Granulowany, kompleksowy nawóz ogrodniczy do borówek i innych roślin kwaśnolubnych (różaneczniki, azalie, wrzośce, paprocie i iglaki).

Nawóz kompleksowy – nawóz, w którym każda granulka zawiera wszystkie składniki niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Nawozy kompleksowe dają pewność równomiernego dostarczania roślinom wszystkich składników pokarmowych.



Florovit do borówek zakwasza glebę, co wyraźnie sprzyja wzrostowi i rozwojowi roślin wymagających stanowiska o niskim odczynie podłoża. Magnez oraz dobrane w specjalnych proporcjach żelazo, cynk i miedź zapobiegają żółknięciu liści w okresie wegetacji roślin.

Regularne stosowanie nawozu:

• zapewnia właściwy, kwaśny odczyn podłoża,



• zapobiega żółknięciu liści w okresie wegetacji,



• gwarantuje prawidłowy wzrost i rozwój roślin.



Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Podane dawki produktu są zaleceniami.

SPOSÓB STOSOWANIA

Borówki

Nawóz, po rozsypaniu wokół rośliny, należy zmieszać z wierzchnią warstwą gleby tak, aby nie uszkodzić korzeni. Zalecane jest także podlanie roślin.

Podczas sadzenia	wiosną	25–50 g/roślinę, mieszając z 25–50 l ziemi
Pierwszy rok uprawy	IV	20 g/m ²
	V	
	VI	
Dalsze lata uprawy	IV	30–35 g/m ²
	V	
	VI	

Zasilanie roślin zaleca się zakończyć do połowy czerwca. Nawożenie powtarzać co ok. 4 tygodnie.

Różaneczniki

Podczas sadzenia	wiosną	25–50 g/roślinę, mieszając z 25–50 l ziemi
Pierwszy rok uprawy	III	20 g/roślinę
	IV	
	V	
Drugi rok uprawy	III	25 g/roślinę
	IV	
	V	
Dalsze lata uprawy	III	30 g/roślinę
	IV	
	V	

Nawożenie powtarzać co ok. 4 tygodnie.

Azalie i wrzośce

Podczas sadzenia	wiosną	10 g/roślinę, mieszając z 10 l ziemi
Pierwszy rok uprawy	IV	10 g/roślinę
	V	
	VI	
Dalsze lata uprawy	IV	10 g/roślinę
	V	
	VI	

W uprawie pojemnikowej nie należy przekraczać dawki 1 g nawozu na 1 litr podłoża.

Iglaki i paprocie

Rośliny te należy nawozić Florovitem do borówek jeśli gleba jest za mało kwaśna – pH gleby powyżej 6.

Podczas sadzenia	wiosną	10 g/roślinę, mieszając z 10–20 l ziemi
Dalsze lata uprawy	III	• wysokość rośliny < 50 cm – 10 g/roślinę • wysokość rośliny > 50 cm – 20 g/roślinę • wysokość rośliny > 100 cm – 40 g/roślinę • wysokość rośliny > 200 cm – 60 g/roślinę



łyżka stołowa zawiera ok. 15 g nawozu

Wskazówki:

- Wymieszanie granulatu z glebą/podłożem polepsza skuteczność działania nawozu.
- Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.
- Nawozy należy rozsiewać na powierzchni odpowiadającej średnicy korony krzewów.

57

138

58

138

408