

N-010 - worek 10 kg

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża

Podczas sadzenia ziemię z dołka lub specjalne podłoże ogrodnicze zmieszać w ilości 20 – 30 g nawozu na roślinę.

Nawożenie roślin owocujących

Dokarmianie pogłównie rozpocząć wiosną, około połowy kwietnia. Drugie i trzecie nawożenie należy przeprowadzić każdorazowo po upływie kolejnych czterech tygodni w następujących dawkach:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

- pierwszy rok po posadzeniu – trzy razy po 25 g/m²
- dalsze lata uprawy – trzy razy po 35-45 g/m².

W przypadku nawożenia pogłównego należy unikać rozsiewu nawozu na mokre rośliny oraz w miarę możliwości zmieszać nawóz z wierzchnią warstwą gleby, tak aby nie uszkodzić korzeni. Zalecane jest także podlewanie roślin.

Zasilanie roślin zaleca się zakończyć do połowy czerwca.

Pełna szklanka ~260 g nawozu
Łyżka stołowa ~17 g nawozu

10 kg

nawet na
400 m²

Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie.
Nie przekraczać dawki. Podane dawki produktu są zaleceniami.

WYPRÓBUJ inne nawozy FruktoVit Plus:

do trawników

do róż

do tui

FruktoVit PLUS DLA TWOJEGO OGRODU

nawóz do borówek

OBFITE OWOCOWANIE

ZDROWY WZROST I KWITNIENIE

10 kg

FruktoVit PLUS DLA TWOJEGO OGRODU

FruktoVit Plus nawóz do borówek

Nawóz zawiera zestaw składników pokarmowych w odpowiednich proporcjach niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju borówki amerykańskiej.

FruktoVit PLUS może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, zarówno dla nowych nasadzeń, jak również do dokarmiania roślin już rosnących (nawożenie pogłowne).

Regularne stosowanie nawozu zapewnia:

szybki i prawidłowy wzrost roślin

intensywne kwitnienie i owocowanie

obfite zbiory o wysokiej jakości

FruktoVit Plus nawóz do borówek

NAWÓZ MINERALNY (PFC 1(C)(I)(a)(ii))
Nawóz kompleksowy NPK (Mg) 9,0-6,0-9,0 (+2,1) / 9,0-2,6-7,5 (+1,3) z mikroskładnikami

SKŁAD NAWOZU: 9,0% AZOT CAŁKOWITY (N); 9,0% azot amonowy; 6,0% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P₂O₅); 3,2% pięciotlenek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie mrówkowym; 9,0% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K₂O); 2,1% CAŁKOWITY TLENEK MAGNEZU (MgO); 0,03% bor (B), jako kwas, rozpuszczalny w wodzie; 0,040% miedź (Cu), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,50% żelazo (Fe), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,15% mangan (Mn), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,040% cynk (Zn), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie.

Składniki: siarczan (VI) amonu^{II} (CAS 7783-20-2), fosforyt miękki^I (CAS 1306-05-4), siarczan (VI) dipotasu^{III} (CAS 7778-80-5), dolomit^I (CAS 16389-88-1), gdzie ^I oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny, ^{II} oznacza CMC 11 – produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.

Granulometria: Granule. 85% produktu przechodzi przez sito 5 mm.

Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIEKARZEM. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Rozsypany nawóz dokładnie zebrać, pozostałość zmyć wodą. W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania.

CE

PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM POMIESZCZENIU W ORYGINALNYCH ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH
Data ważności na opakowaniu.

38,82 mm

90397VCE01

28,3 mm

5 900498 029918

masa netto 10 kg

GRUPA INCO S.A.

ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa

Zakład Produkcyjny w Suszu

tel./fax +48 55 242 75 00

fruktovit.pl

50 mm

25 mm

Nawóz zawiera zestaw składników pokarmowych w odpowiednich proporcjach niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju borówki amerykańskiej.

FruktoVit PLUS może być stosowany na wszystkich rodzajach gleb, zarówno dla nowych nasadzeń, jak również do dokarmiania roślin już rosnących (nawożenie pogłowne).

Regularne stosowanie nawozu zapewnia:



FruktoVit Plus nawóz do borówek

NAWÓZ MINERALNY (PFC 1(C)(I)(a)(ii))

Nawóz kompleksowy NPK (Mg) 9,0-6,0-9,0 (+2,1) / 9,0-2,6-7,5 (+1,3)
z mikroskładnikami

SKŁAD NAWOZU: 9,0% AZOT CAŁKOWITY (N); 9,0% azot amonowy; 6,0% CAŁKOWITY PIĘCIOTENLEK FOSFORU (P₂O₅); 3,2% pięcioletek fosforu (P₂O₅) rozpuszczalny w kwasie młokowym; 9,0% ROZPUŚCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K₂O); 2,1% CAŁKOWITY TLENEK MAGNEZU (MgO); 0,03% bor (B), jako kwas, rozpuszczalny w wodzie; 0,040% miedź (Cu), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,50% żelazo (Fe), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,15% mangan (Mn), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,040% cynk (Zn), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie.

Składniki: siarczan (VI) amonu¹ (CAS 7783-20-2), fosforyt miękki¹ (CAS 1306-05-4), siarczan (VI) dipotasu¹ (CAS 7778-80-5), dolomit¹ (CAS 16389-88-1), gdzie ¹ oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny, ¹¹ oznacza CMC 11 – produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.


Granulometria: Granule. 85% produktu przechodzi przez sito 5 mm.

Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.

Chronic przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIE-
CIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM
ZATRUCIEK/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać
wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo
usunąć. Nadal płukać. Rozsypyany nawet dokładnie zebrać, pozostałość zmyć
wodą. W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy
postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania.



PRZECIWIŻYĆ W SUCHYM
POMIESZCZENIU W ORYGINALNYCH
ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH
Data ważności na opakowaniu.



GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax +48 55 242 75 00
fruktovit.pl

