

NAWÓZ DO
IGLAKÓW

PRZECIWKO BRĄZOWIENIU IGIEŁ
Z MIKROSKŁADNIKAMI

Produkty polecane do
pielęgnacji iglaków:



Mospilan® 20 SP
zwalczasz mszyce i inne
szkodniki roślin



Gotowe Pożłoże
do iglaków



Biosept Active
poprawia odporność
roślin na choroby



Emulpar® 940 EC
zwalcza zimujące
formy szkodników

Target



SPRAWDŹ

NAWÓZ DO
IGLAKÓW

PRZECIWKO BRĄZOWIENIU IGIEŁ



4 kg

większa odporność
intensywne wybarwienie

- ODPOWIEDNIO ODŻYWIONE ROŚLINY
- PRAWIDŁOWY ROZWÓJ ROŚLIN
- OPTYMALNY SKŁAD

NAWÓZ DO
IGLAKÓW

PRZECIWKO BRĄZOWIENIU IGIEŁ
Z MIKROSKŁADNIKAMI

CE

STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
(PFC 1(C)(I)(a))i NPK (Mg) nawóz zawierający
mikroelementy pokarmowe, 9,5-7-13 (+3)

9,5 % (m/m) CAŁKOWITEGO AZOTU (N)
9,5 % (m/m) azotu amonowego
7,0 % (m/m) CAŁKOWITEGO PIĘCIOTLENKU FOSFORU (P₂O₅)
13,0 % (m/m) CAŁKOWITEGO TIENKU POTASU (K₂O)
3,0 % (m/m) CAŁKOWITEGO TIENKU MAGNEZU (MgO)
0,01% (m/m) boru (B) w postaci kwasu, rozpuszczalny w wodzie
0,02 % (m/m) żelaza (Fe) w postaci siarczanu, rozpuszczalne w wodzie

Składniki:

- siarczan amonu (CMC1) nr CAS 7783-20-2,
- fosforan dwuamonowy (CMC1) nr CAS 7783-28-0,
- chlerek potasu (CMC1) nr CAS 7447-40-7,
- siarczan magnezu (CMC1) nr CAS: 7487-88-9,
- bor w postaci kwasu (CMC1) nr CAS 10043-35-3,
- żelazo w postaci siarczynu (CMC1) nr CAS 17375-41-6 CMC1- Pierwotne surowce i mieszaniny

Zalecane warunki przechowywania:

Przechowywać w suchym, nienasłonecznionym i chłodnym miejscu,
z dala od dzieci.

Granulometria: Granule. 95% produktu ma postać granul
o wymiarach 2,0 – 6,0 mm.

Data produkcji: na opakowaniu

Okres przydatności do stosowania: bezterminowo

OTT19ZTX/WZ10

Target

NAWÓZ DO
IGLAKÓW



PRZECIWKO BRĄZOWIENIU IGIEŁ Z MIKROSKŁADNIKAMI

ODPOWIEDNIO ODŻYWIONE ROŚLINY, PRAWIDŁOWY ROZWÓJ ROŚLIN, OPTYMALNY SKŁAD
ZAŁĄCZONA MIARKA ZAPEWNIĄ PRECYZYJNE DAWKOWANIE

Instrukcja i dawki:

CHARAKTERYSTYKA NAWOZU:

Nawóz TARGET do iglaków przeciwko brązowieniu igieł jest specjalnie przygotowanym nawozem dla tej grupy
roślin, zawierającym dodatkowo oprócz azotu, potasu i fosforu także magnez, który wpływa na soczystość zielone
wybarwienie igieł.

TERMIN STOSOWANIA:

Od marca do lipca co 3-4 tygodnie.

ZALECANE TERMINY STOSOWANIA:

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

najlepszy termin

nie stosować

DAWKI:

W zależności od wielkości krzewu 25-100 g na krzew lub na 1 m² podłoża, krzewy powyżej 1,5 metra - 50-100 g na
każdy metr wysokości krzewu (w opakowaniu znajduje się miarka z dwoma poziomami: 25 g i 50 g).

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Powyższe zalecenia dot. nawożenia są ogólne i odnoszą się do średniej wielkości okazów roślin. Częstotliwość
stosowania oraz dawka nawozu powinny być zawsze dobrane do indywidualnych potrzeb rośliny oraz warunków
uprawy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkownika będące naruszeniem zasad dobrej praktyki
uprawy roślin.

- Nie jeść i nie pić po użyciu nawozu.
- W przypadku dostania się nawozu do oka - przemyć oko obficie czystą wodą.
- Stosować rękawice ochronne.
- Nie wrzucać do zlewu, kanalizacji i systemów drenażowych.
- Nawozy stosować w sposób rozsądny, a nawożenie powinno wynikać z potrzeb rośliny i zasobności podłoża.
- W przypadku dostania się nawozu na powierzchnię nieprzeznaczone do nawożenia (np. kostka brukowa, kamienie,
zrębki uszłe do ściółkowania itp.) należy niezwłocznie zebrać nawóz - niebezpieczeństwo wystąpienia przebarwień.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rośliny iglaste dobrze rosną zarówno na stanowiskach słonecznych jak i zacienionych. Podłoże powinno być żyzne
i przepuszczalne, składające się z mieszanki torfu niskiego i wysokiego oraz kompostu korowego. Igłaki powinny być
podlewane dogłębowo, co pozwoli roślinie uzupełnić ilość płynów oraz zapobiegnie chorobom grzybowym. Należy
pamiętać o podlewaniu roślin jesienią. Rośliny iglaste wymagają cieplej. Pierwszym terminem ciepła jest wiosna, wtedy
wycinamy pędy uszkodzone przez mroz, odkształcone i nadzwane przez śnieg. Ciepło w okresie letnim to ciepło
formujące. Należy unikać cięcia po sierpniu, gdyż pędy mogą przemarzać. Nawożenie organiczne i mineralne
rozpoczynamy wiosną i kontynuujemy do lipca. Igłaki nawożymy trzy do czterech razy w sezonie, w odstępach
co miesiąc. Brązowienie igieł może być spowodowane przez wiele przyczyn innych niż braki składników pokarmo-
wych: choroby, szkodniki, brak wody, przenawożenie itd.

SPOSÓB STOSOWANIA:

- Określić wielkość krzewu.
- Odmierzyć zalecaną
dawkę nawozu.
- Rozsypać wokół roślin.
- Wymieszać dokładnie
granulat z górną
warstwą ziemi.
- Podlać roślinę, aby uaktywnić
substancje zawarte w nawozie.
- Pamiętać o regularnym
podlewaniu i nawożeniu
co 4 tygodnie.

TARGET.COM.PL

sposób na zadbane ogród

Producent:
TARGET S.A.
Kartuszy, ul. Przemysłowa 5,
84-110 Kartuszy,
ul. 58 774 10 90,
fax: 58 676 74 89
email: info@target.com.pl

data produkcji i numer partii:



Masa netto:
4 kg e



Target


SPRAWDŹ

• ZAWIERA •
• MIKROSKŁADNIKI •
+ B
+ Fe

OT1921XZF210

NAWÓZ DO
IGLAKÓW

PRZECIWKO BRĄZOWIENIU IGIEŁ

ODPOWIEDNIO ODŻYWIONE ROŚLINY

PRAWIDŁOWY ROZWÓJ ROŚLIN

OPTYMALNY SKŁAD

4 kg

większa odporność
intensywne wybarwienie