

N_027 - Wiadro 4 kg

20,9

100,16

193,76

41,7

100,16

193,76

20,9

NW500030034 – Florovit nawóz do borówek 4 kg [Wiaderko]

754,80

Florovit nawóz do borówek i innych roślin kwaśnolubnych

Nawóz MINERALNY (PFC 1)(I)(a)(iii)
Nawóz kompleksowy NPK (Mg) 12,0-6,0-13,0 (2,6) / 12,0-2,6-10,8 (1,5)
z mikroskładnikami

SKŁAD NAWOZU: 12,0% AZOT CAŁKOWITY (N); 12,0% azot amonowy; 6,0% CAŁKOWITY
PIECIOTLENK FOSFORU (P₂O₅); 3,9% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P₂O₅);
6,0% pięciotlenek fosforu (P₂O₅); rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu;
13,0% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K₂O); 2,6% CAŁKOWITY TLENEK MA-
GNEZU (MgO); 2,6% rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu (MgO); 0,05% bor (B), jako
kwas, rozpuszczalny w wodzie; 0,100% miedź (Cu), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie;
0,50% żelazo (Fe), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie; 0,27% mangan (Mn), jako siar-
czan, rozpuszczalny w wodzie; 0,005% molibden (Mo), jako molibdenian amonu, rozpusz-
czalny w wodzie; 0,040% cynk (Zn), jako siarczan, rozpuszczalny w wodzie.

Składniki: siarczan (VI) amonu¹¹ (CAS 7783-20-2), siarczan (VI) dipotasu¹ (CAS 7778-
80-5), fosforan amonu¹ (CAS 7783-28-0), siarczan (VI) magnezu¹ (CAS 7487-88-9), gdzie
¹ oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny, ¹¹ oznacza CMC 11 – produkty uboczne
w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.

Granulometria: Granule, 90% produktu przechodzi przez sito 5 mm.

Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.
Niska zawartość chlorów.

Chronić przed dziećmi. Stosować rekawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przy-
padku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUCIĆ/lekarzem. W PRZY-
PADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki
kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Rozsypany nawóz dokładnie
zebrać, pozostałość zmyć wodą. W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środo-
wiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania.



30034vCE01



GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25
00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl



masa netto 4 kg

mikrogranulat

florovit

**nawóz do borówek
i innych roślin kwaśnolubnych 4 kg**

wystarcza
nawet na 200 m²

prawidłowy wzrost,
obfite plony

duże,
smaczne owoce

**Wypróbuj
inne nawozy Florovit:**



nawóz zakwaszający



do rododendronów



do winorośli



Ogród Complex

florovit.pl

mikrogranulat

florovit

**Granulowany, kompleksowy nawóz
ogrodniczy do borówek i innych
roślin kwaśnolubnych (rózanezniki,
azalie, wrzośce, paprocie i iglaki).**


**Nawóz komple-
sowy** – nawóz,
w którym każda
granulka zawiera
wszystkie składniki
niezbędne dla pra-
widłowego wzrostu
i rozwoju roślin.

Nawozy kompleksowe dają pewność równomier-
nego dostarczania roślinom wszystkich składni-
ków pokarmowych.

Florovit do borówek zakwasza glebę, co wy-
raźnie sprzyja wzrostowi i rozwojowi roślin
wymagających stanowiska o niskim odczynie
podłoża. Magnez oraz dobrane w specjalnych
proporcjach żelazo, cynk i miedź zapobiegają
żółknięciu liści w okresie wegetacji roślin.

Regularne stosowanie nawozu:

- zapewnia właściwy,
kwaśny odczyn podłoża,
- zapobiega żółknięciu
liści w okresie wegetacji,
- gwarantuje prawidłowy
wzrost i rozwój roślin.



SPOSÓB STOSOWANIA

Borówki

Nawóz, po rozsypaniu wokół roślin, należy zmieszać
z wierzchnią warstwą gleby tak, aby nie uszkodzić ko-
rzeń. Zalecane jest także podlanie roślin.

Podczas sadzenia	wiosną	25-50 g/roślinę, miesząc z 25-50 l ziemi
Pierwszy rok uprawy	IV, V, VI	20 g/ m ²
Dalsze lata uprawy	IV, V, VI	30-35 g/ m ²

Zasilenie roślin zaleca się zakończyć do połowy
czerwca. Nawożenie powtarzać co ok. 4 tygodnie.

Różanezniki

Podczas sadzenia	wiosną	25-50 g/roślinę, miesząc z 25-50 l ziemi
Pierwszy rok uprawy	III, IV	20 g/roślinę
Drugi rok uprawy	III, IV	25 g/roślinę
Dalsze lata uprawy	III, IV	30 g/roślinę

Nawożenie powtarzać co ok. 4 tygodnie.

Wskazówki:

- wymieszanie granulatu z glebą/podłożem polepsza skuteczność
działania nawozu
- regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia
- nawozy należy rozsiewać na powierzchni odpowiadającej średnicy
korony krzewów

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.
Podane dawki produktu są zaleceniami.

Azalie i wrzośce

Podczas sadzenia	wiosną	10 g/roślinę, miesząc z 10 l ziemi
Pierwszy rok uprawy	IV	
Drugi rok uprawy	IV	10 g/roślinę
Dalsze lata uprawy	IV, VI-VII	

W uprawie pojemnikowej nie należy przekraczać
dawki 1 g nawozu na 1 litr podłoża.

Iglaki i paprocie

Rośliny te należy nawozić Florovitem do borówek jeśli
gleba jest za mało kwaśna – pH gleby powyżej 6.

Podczas sadzenia	wiosną	10 g/roślinę, miesząc z 10-20 l ziemi
Dalsze lata uprawy	III	- wys. rośliny < 50 cm – 10 g/roślinę - wys. rośliny > 50 cm – 20 g/roślinę - wys. rośliny > 100 cm – 40 g/roślinę - wys. rośliny > 200 cm – 60 g/roślinę



Pełna szklanka
zawiera
ok. 240 g nawozu

151,38

mikrogranulat

florovit®



**wystarcza nawet
na 200 m²**

**prawidłowy wzrost,
obfite plony**

duże, smaczne owoce

40050vCE01

150,53

240,53

268,34