



**INNE
ZWYCZAJNA
BABKA**



**BIAŁA
KONICZYNA**



MNISZEK

TRAWNIKACH

zwalcza chwasty na

MLECZ

z apteki ogrodnika

losob



MLECZ

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

HERBICID selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego (SL). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne wchodzące w skład środka zaliczane są do grupy O.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancje czynne z grupy regulatorów wzrostu. Środek pobierany jest przez liście chwastów. W roślinie powoduje zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg, zahamowania wzrostu, karłowacenia, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania roślin. Środek najlepiej stosować gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie siewki do fazy 6 liści właściwych. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach, a proces obumierania następuje po upływie 7 dni od zastosowania. Warunki sprzyjające wzrostowi i rozwojowi roślin, tj.: temperatura powyżej 12°C, odpowiednia wilgotność gleby, światło słoneczne wzmacniają skuteczność działania środka. Deszcz w ciągu 24 godzin od zabiegu zmniejsza skuteczność działania środka (zmywanie).

Chwasty średniooporne: jaskier rozłogowy, koniczyzna biała, mniszek lekarski, stokrotka polna.

Zawartość substancji czynnych:

2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 70 g/l (6,59 %), MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 70 g/l (6,59%), mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) – 42 g/l (3,95 %); dikamba (związek z grupy fenoksykwasów) – 20 g/l (1,88%).

STOSOWANIE ŚRODKA


Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Trawniki

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml środka /10 l wody/100 m².

Termin stosowania:

Środek można stosować w czasie całego okresu wegetacji traw (od kwitnienia do pobny wrzesnia), w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Zabieg najlepiej wykonać gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie siewki do fazy 6 liści właściwych. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 10 l/100 m². Zalecane opryskiwanie: średnokropliste.



Zawartość netto: 20 ml



UWAGA

Zezwolenie MR/RW nr R-125/2013pc z dnia 14.10.2013 r.
odmówione decyzją MR/RW nr R-135/2018dz dnia 17.04.2018 r.
ostаточно zmienione decyzją MR/RW nr R-818/2019d z dnia 04.11.2019 r.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o.
ul. Przasnyska 6b, 01-735 Warszawa
tel.: +48 22 886 41 80
e-mail: sekretariat@arysta.com



Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
Maszyni 2, 98-400 Włocławek
tel.: +48 62 783 20 00, fax: +48 62 784 44 45
e-mail: agpecol@agpecol.pl

PRZESTRZEGAJ ETYKIETY ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W CELU OGRANICZENIA RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA.

Pbny tekst etykiety środka dółgany jest do opakowania. Przed użyciem środka należy zapoznać się z jej treścią.



2237W



Aplikator
łatwiający precyzyjne dozowanie

20 ml

2237W

20 ml