

## NIEBEZPIECZYSTWO



**Zawiera:** symklosen

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.  
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.  
H301 Działa drażniąco na oczy.  
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.  
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  
EUH 032 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.  
P102 Chronić przed dziećmi  
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła.  
P261 Unikać wdychania pyłu  
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.  
P280 Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu.  
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem  
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do oddechu w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.  
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie spłukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  
P501 Pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.

## Bezpośrednie i pośrednie skutki uboczne dla zdrowia człowieka:

Podrażnienie błon śluzowych, ból gardła, kaszel, utrudniony oddech. Nie są znane inne skutki narażenia niż te wymienione oraz wynikające z klasyfikacji.

### Pierwsza pomoc:

Spożycie: W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów. Podać do wypicia białko jaj kurzych, ewentualnie mleko. Poza tym nie podawać niczego dośownie. Nie podawać środków zobojętniających. Zapewnić opiekę lekarską.

### Magazynowanie:

Produkt przechowywać w oryginalnych opakowaniach producenta, w chłodnych i przewiewnych pomieszczeniach z dala od substancji utleniających, kwasów i substancji łatwopalnych. Składować w temperaturze 5 - 25°C. Chronić przed wilgocią i kontaktem z innymi substancjami.

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 6245/15

[target.com.pl](http://target.com.pl)

### Dystrybutor:

Tamark S.A. Kartoszyno  
54-110 Krokowa  
ul. Przemysłowa 5  
tel.: 58 774 10 90, 58 774 10 91  
fax: 58 676 74 89

### Podmiot odpowiedzialny:

Gotix Sp. z o.o.  
Merlina 5; Zamość  
89-200 Szulbin  
tel. (052) 384 58 23  
BDO Wytwórcy 000083723  
UFI G710-10AM-700F-3HT7

### Termin ważności:

24 miesiące od daty produkcji.

### Data produkcji / nr serii:

na opakowaniu.

Masa netto: **1 kg**



# Target



SPRAWDŹ  
JAK

## ChlorTix T

## DEZYNFEKUJE WODĘ BASENOWĄ

## ZWALCZA BAKTERIE I GRZYBY BASENY • JACUZZI • SPA

## 5 tabletek x 200 g

### ChlorTix T

#### Skład:

Substancja czynna - symklosen CAS: 87-90-1, WE: 201-782-8, zaw. 990 g/kg (zaw. aktywnego chloru 900 g)

#### Postać preparatu:

tabletki.

#### Zakres stosowania:

Preparat bakteriobójczy, grzybobójczy - do dezynfekcji wody basenowej lub przeznaczonej do spożycia.

#### Działanie:

Produkt działa bójco wobec: *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus hirae*, *Legionella pneumophila*, *Candida albicans*, *Aspergillus niger*.

#### Sposób użycia:

##### Dezynfekcja wody basenowej

##### Baseny z automatyczną stacją dozującą

W przypadku obecności w wodzie basenowej jednego z poniższych szczepów bakterii dozować produkt w następującym schemacie:  
*Staphylococcus aureus* (gronkowiec złocisty) - dawkowanie 5 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h).  
*Escherichia coli* - dawkowanie 2 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h);  
*Enterococcus hirae* ( paciorkowiec) - dawkowanie 5 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h);  
*Pseudomonas aeruginosa* (ropa błękitna) - dawkowanie 5 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h);  
*Legionella pneumophila* - dawkowanie 5 mg/l (efekt biobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h).  
Ogólne działanie bakteriobójcze uzyskujemy przy dawkowaniu 5 mg/l. Efekt bakteriobójczy jest uzyskiwany po okresie 24 h.

Podczas całego procesu wartość pH powinna być utrzymywana w przedziale 6,9-7,2.

Po procesie dezynfekcji zawartość wolnego chloru w wodzie nie powinna przekraczać wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

##### Baseny pryzmowe bez automatycznej stacji dozującej

Przy napełnianiu basenu wodą o jakości wody przeznaczonej do spożycia należy doprowadzić pH do poziomu 6,9-7,2. Przy włączonej pompie cyrkulacyjnej zapewnijającej stałe i równomierne mieszanie wody - zastosować 60 g preparatu na 10 m³ wody (efekt bakteriobójczy uzyskujemy po okresie 24 h).

**60 g produktu to: 1/3 szklanki tabletek o gramaturze 0,01-0,5 g lub**

**6 tabletek o gramaturze 10 g lub**

**3 tabletki o gramaturze 20 g.**

**Tabletki 200 g zaleca się stosować do basenów o większej pojemności. 1 tabletki 200 g wystarcza na uzyskanie efektu bakteriobójczego w 33 m³ wody.**

Zaleca się powtórzenie czynności raz w tygodniu. Duża liczba osób korzystających z basenu oraz silne nasłonecznienie wpływają na szybsze zużycie chloru w wodzie basenowej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zaleca się po 3 dniach dodać 30 g preparatu na 10 m³ wody.

Produkt można dawkować bezpośrednio za pomocą skimmera lub pływaka dozującego. Zaleca się również sposób dozowania za pomocą słuzki dozującej. Nigdy nie należy dozować preparatu bezpośrednio do basenu. Grozi to miejscowym odbarwieniem folii basenowej.

Po procesie dezynfekcji zawartość wolnego chloru w wodzie nie powinna przekraczać wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

##### Zastosowanie bójki dozującej:

- Przed zastosowaniem należy wyregulować odczyn pH wody w basenie za pomocą środków pH minus lub pH plus. Zalecamy zakres pH wody 6,5-7,6. Im niższe pH wody tym środki chlorujące lepiej działają.
- Przekrećć pokrywę bójki pływającej i ustawić liczbę otworów przez które będzie wypływający produkt odpowiednio do wielkości basenu.
- Umieścić bójkę w basenie.
- Przed wejściem kąpielących się do basenu wyjąć bójkę pływającą i umieścić w pojemniku z wodą.
- Po zakończeniu kąpieli ponownie umieścić bójkę w basenie.
- Wodę z pojemnika wlać do basenu.
- Zalecenie: nie umieszczać bójki pływającej w skimmerach, unikając bezpośredniego kontaktu z produktem, kontrolować odczyn pH i poziom aktywnego chloru w wodzie basenowej.
- Dodatkową kontrolę parametrów wody basenowej i odpowiednią korektę przeprowadzić przy dużej ilości użytkowników, po burzy, przy silnym wietrze, wysokiej temperaturze i nasłonecznieniu.

##### Dezynfekcja wody przeznaczonej do spożycia w studniach skążeń np. podczas powodzi

Do dezynfekcji wody w studniach zastosować 5 tabletek o gramaturze 200 g na 1 kg studni (na 1 m³ wody). Efekt bakteriobójczy uzyskujemy po 5 minutach, efekt grzybobójczy po 15 minutach. Woda nadaje się do spożycia, gdy pozostałości wolnego chloru spadną do poziomu określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.