



MOCZNIK

nawóz mineralny

2 kg





MOCZNIK

nawóz mineralny

NAWÓZ WE
Typ A.1.9. Mocznik N 46

Skład nawozu w % (m/m):
46% - azot (N) całkowity, w tym:
• 46% - azot (N) amidowy

ZASTOSOWANIE

Mocznik jest bardzo uniwersalnym nawozem do dokarmiania pozakorzeniowego (dolistnego), a przede wszystkim do nawożenia dogłębowego. Może być stosowany pod wszystkie rośliny uprawne, przedsięwzię i pogłównie oraz dolistnie w roztworze wodnym o stężeniu dostosowanym do wymagań dokarmianego gatunku i fazy rozwojowej rośliny. Na glebach bardzo kwaśnych, silnie zasadowych lub świeżo zwapnowanych daje mniejsze efekty. Mocznika nie wolno mieszać z innymi nawozami azotowymi. Ze względu na higroskopijność można go mieszać na krótko przed rozsiewem z Polifoską®Ogród, solą potasową i jedynym nawozem azotowym – siarczanem amonowym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Chronić przed dziećmi. Nie spożywać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. W razie przypadkowego rozsypania nawóz zebrać na sucho, a w razie konieczności zabrudzoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody. Nie przekraczać zalecanych dawek nawozu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

PRZESTRZEGAĆ ZASAD PRZECHOWYWANIA I TRANSPORTOWANIA



Zalecane dawki mocznika* w kg/ha

Roślina	Potrzeby nawożenia azotem		
	bardzo małe i małe	średnie ¹	duże i bardzo duże
żyto, jęczmień i owies – na każdą 1 t ziarna	35	40	55
pszenice i pszenżyto – na każdą 1 t ziarna	40	55	65
rzepak – na każdą 1 t nasion	90	110	130
kukurydza na silos na oborniku – na każde 10 t zielonej masy	60	35	45
kukurydza na ziarno – na każdą 1 t ziarna	33	43	50
groch, bobik – na każdą 1 t nasion	20	30	40
ziemniak na oborniku ² – na każde 10 t bulw	65	75	90
ziemniak bez obornika – na każde 10 t bulw	90	100	110
burak cukrowy bez obornika – na każde 10 t korzeni	90	100	110
burak pastewny na oborniku – na każde 10 t korzeni	22	33	37
łąki i pastwiska – na każde 2 t siana lub 10 t zielonej masy	40	45	54
trawy w uprawie polowej – na każde 10 t zielonej masy	87	110	125
trawy z motylkowatymi – na każde 10 t zielonej masy	43	55	65

*w zależności od przewidywanego plonu obliczyć dawkę mocznika, np. plon ziarna pszenicy 5 t z ha na glebie o średnich potrzebach nawożenia azotem stosować po 55 kg mocznika na każdą 1 tonę przewidywanego plonu ziarna (odczyt z tabeli) x 5 ton = 275 kg/ha mocznika, czyli około 125 kg azotu;

¹ – jeżeli występują problemy z oceną potrzeb nawożenia azotem zaleca się dawki w wysokości jak dla średnich potrzeb nawożenia;

² – zalecana dawka obornika pod ziemniaki 25 t/ha, pod buraki cukrowe 35 t/ha

Data ważności (nr partii) - podany na zgrzewie opakowania

Producent:

AGRECOL

AGRECOL Sp. z o.o.
98-400 Wieruszów, Meszarny 2
tel.: +48 62 78 32 000,
infolinia: +48 62 72 08 018
www.agrecol.pl



Masa netto: **2 kg**