



H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH208 Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 Unikać wdychania mgły, rozpylonej cieczy. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P391 Zebrać wyciek.



Uwaga

Posiadacz zezwolenia:
SYNGENTA Polska Sp. z o.o.
ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
tel.: 22 326-06-01, fax: 22 326-06-99
www.syngenta.pl



Podmiot odpowiedzialny
za końcowe pakowanie
i etykietowanie środka
ochrony roślin: **TARGET S.A.**
Kartoszyń, ul. Przemysłowa 5
84-110 Krokowa
tel.: 58 774 10 90, fax: 58 774 10 91
e-mail: info@target.com.pl
www.target.com.pl

AMICS025K2211
POLAND/TT/9Y

AMISTAR® 250 SC

**ZWALCZA I ZAPOBIEGA
CHOROBYM**

**DZIAŁANIE WGŁĘBNE
I SYSTEMICZNE**

**SUBSTANCJA ODPORNA
NA ZMYWANIE**

Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu głębokim i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby. Substancja czynna azoksystrobina należy do FRAC grupa 1.

STOSOWANIE ŚRODKA

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Środek przeznaczony
do stosowania przez użytkowników
nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnej:
Azoksystrobina: związek z grupy strobiluryn – 250 g/l (22,81%)

**Zezwolenie MRiRW nr R - 40/2011
z dnia 09.06.2011 r., odnowione decyzją
MRiRW nr R - 877/2019d z dnia 3.12.2019 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW
nr R - 28/2021m z dnia 06.05.2021 r.**

wybrane zastosowania	dawkę
alternarioza, mączniak prawdziwy (w uprawie polowej)	8 ml w 4-12 l wody
szara pleśń, alternarioza, zgnilizna twardzikowa	8-10 ml w 4-15 l wody
ziemniak	5 ml w 3-4 l wody
cebula, czosnek	8 ml w 2-7 l wody
kapusta głowiasta (do długotrwałego przechowywania)	8 ml w 2-7 l wody
marchew	8 ml w 2-7 l wody



DRUK:
MULTI-DRUK
Kartoszyń
tel. (058) 774 10 92

Pełny tekst etykiety środka dołączony jest do opakowania.
Przed użyciem przeczytać instrukcję podane w załączonej ulotce.



na
25 L
wody



SPRAWDŹ
JAK

ZWALCZA

**SZARĄ PLEŚŃ
ALTERNARIOZĘ
MĄCZNIAKA RZEKOMEGO**

CHOROBY WARZYZ



szara pleśń
na kapuście



alternarioza
pomidora



mączniak rzekomy
na cebuli

AMISTAR® 250 SC

25 ml

Zawartość netto: 25 ml e
Data produkcji i nr partii: na opakowaniu
Okres ważności: 3 lata

Zwalcza choroby WARZYW

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W przypadku zastosowania środka w uprawie ziemniaka w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od zbiorników i cieków wodnych pokrytej roślinnością o szerokości 10 m.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): por – **21 dni**, cebula, czosnek, szalotka, kapusta głowiasta, kapusta pekińska, kalfior, groch na zielone nasiona, seler korzeniowy, sałata, marchew – **14 dni**, ziemniak, fasola szparagowa – **7 dni**, papryka, pomidor – **3 dni**.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.