




STARANE® TRAWNIKI



Nie kosić trawnika do 3 dni przed zastosowaniem środka (aby zwalczane chwasty były jak największe) oraz przez co najmniej 3 dni po zastosowaniu środka (aby umożliwić przemieszczenie środka do korzeni). Podczas opryskiwania trawników w pobliżu innych roślin uprawnych, drzew i krzewów nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na rośliny uprawne, korony drzew i krzewy (zwłaszcza na niezdrewniałe części roślin). Ograniczyć do minimum możliwość zetknięcia się cieczy użytkowej środka z glebą w pobliżu krzewów oraz pod koronami drzew. Środka nie stosować na trawnikach młodych, z roślinami słabo ukorzenionymi, na rośliny chore, wysuszone lub uszkodzone, w czasie nadmiernej suszy lub przed zbliżającym się deszczem.

Działa drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zebrać wyciek.

STAEW020K/2210

STARANE® TRAWNIKI
ZWALCZA CHWASTY
RAZEM Z KORZENIAMI
TRZY SUBSTANCJE AKTYWNE

Starane® Trawniki jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (emulsja olejowa w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:

fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) w postaci estru (fluroksypyr metylu) – **40 g/l** (3,66%)
chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) w postaci soli monoetanoloaminowej – **20 g/l** (1,83%)
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) w postaci soli potasowej – **200 g/l** (18,34%)

Zezwolenie MRiRW
nr R - 9/2014 z dnia 17.01.2014 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW
nr R - 186/2021 d z dnia 27.04.2021 r.

zastosowanie	dawka
trawniki	30-40 ml
poła golfowe	w 2-3 l
boiska sportowe	wody na 100 m ²

Pełny tekst etykiety środka dołączony jest do opakowania. Przed użyciem przeczytać instrukcje podane w załączonej ulotce.

Posiadacz zezwolenia:
Corteva Agriscience Poland Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 1
00-728 Warszawa,
tel.: +48 22 548 73 00, fax: 22 548 73 09
e-mail: biuro@corteva.com
www.corteva.pl



Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie: TARGET S.A.
Kartoszyń, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa
tel.: 58 774 10 90, fax: 58 676 74 89
e-mail: info@target.com.pl
www.target.com.pl



UWAGA



DRUK:
MULTI-DRUK
Kartoszyń
tel. (058) 774 10 92

na
2L
wody



↑
**SPRAWDŹ
JAK**

ZWALCZA

CHWASTY NA TRAWNIKU



babka zwyczajna



mniszek pospolity



stokrotka pospolita

STARANE® TRAWNIKI

20 ml

Zawartość netto: 20 ml
Data produkcji i nr partii: na opakowaniu
Okres ważności: 2 lata

ZWALCZA CHWASTY NA TRAWNIKU

Działanie na chwasty

Środek działa układowo. Pobierany jest przez liście i przemieszczany do korzeni chwastów, powodując **zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin**. Pierwsze objawy na chwastach wrażliwych pojawiają się po upływie 1-2 dni. Wzrost chwastów zostaje zahamowany i chwasty zamierają po upływie 3-4 tygodni. Środek działa najsukuteczniej po zastosowaniu w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Chwasty wrażliwe: babka lancetowata – wrażliwa tylko przy dawce 4 l/ha, babka zwyczajna gwiazdnica pospolita, koniczyna biała, maruna bezwonna, mniszek pospolity, przytulia czepna, stokrotka pospolita, niezapominajka polna, szczaw tępo listny.

Środek stosować podczas dobrej pogody, na wilgotną glebę od wiosny do wczesnej jesieni w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w starszych fazach rozwojowych oraz w przypadku silnego zachwaszczenia zwłaszcza babkami i mniszkiem pospolitym.

Nie stosować trawy pochodzącej z 3 kolejnych koszeń trawnika po zastosowaniu herbicydu Starane Trawniki do kompostowania oraz do ściółkowania jakichkolwiek roślin uprawnych, ozdobnych, krzewów i drzew.

