




SCORPION® 325 SC

Target



Uwaga

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu. H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P261 - Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. P264 - Dokładnie umyć ręce po użyciu. P272 - Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. P280 Stosować rękawice ochronne. P301 + P312 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: w przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody /mydłem. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362 + P364 Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. P391 Zebrać wyciek.

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Agro GmbH,
Am Technologiepark 1-5,
D-63477 Maintal, Republika Federalna Niemiec, tel.: +49,6181 9081 414, fax: +49,6181 9081 319.

syngenta

SCOSC030K2301
POLAND/TT/12A

SCORPION® 325 SC

DZIAŁANIE WGŁĘBNE I UKŁADOWE

STOSOWANIE ZAPOBIEGAWCZO I INTERWENCYJNIE

FUNGICYD, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą (SC) o działaniu wgłębnym i układowym, stosowany zapobiegawczo i interwencyjnie w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby.

Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna difenokonazol zaliczana jest do grupy FRAC 3, natomiast substancja czynna azoksystrobina zaliczana jest do grupy FRAC 11.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Zawartość substancji czynnych:
azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn) – **200 g/l (18,1%)**.
difenokonazol (związek z grupy triazoli) – **125 g/l (11,3%)**.

Zezwolenie MRiRW nr R-6/2013wu z dnia 22.04.2013 r. odnowione decyzją MRiRW nr R-301/2019d z dnia 05.04.2019 r., ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R – 875/2022d z dnia 25.11.2022 r.

wybrane zastosowania	dawkę
rośliny ozdobne (z wyłączeniem ozdobnych odmian jabłoni) (w polu)	10 ml w 3-12 l wody/100m ²
truskawka	10 ml w 3-12 l wody/100m ²
truskawka	biała plamistość liści
ogórek	mączniak prawdziwy, alternarioza, brunatna plamistość liści
cebula	mączniak prawdziwy, parch dyniowatych, antraknoza dyniowatych, alternarioza dyniowatych, alternarioza cebulowych, rdza pora



Pełny tekst etykiety środka dołączony jest do opakowania. Przed użyciem przeczytać instrukcję podane w załączonej ulotce.

Druk:
MULTI-Druk
Kartoszyne
tel. (058) 774 10 92

na
36L
wody



SPRAWDŹ
JAK

Target

ZWALCZA

**CHOROBY ROŚLIN
OZDOBNYCH**



zamieranie pędów
jałowca



mączniak
prawdziwy



rdza na sośnie
wejmutce

SCORPION® 325 SC

30 ml

Zawartość netto: 30 ml e
Data produkcji i nr partii: na opakowaniu
Okres ważności: 3 lata

Zwalcza choroby ROŚLIN OZDOBNYCH

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):
Uprawa pod osłonami i w szklarni: ogórek, cukinia, kabaczek, patison, truskawka, poziomka, melon, kawon (syn. arbuz), dynia olbrzymia jadalna, papryka, pomidor i oberżyna (syn. bakłażan) – **3 dni**; seler naciowy – **14 dni**; grupa салат (sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia), kapustne liściowe (rukola – rókietta siewna, jarmuż), szpinak, seler listkowy, pietruszka (uprawiana na nać), rośliny zielarskie, kwiaty jadalne – **14 dni**; cykoria салатowa – **21 dni**; malina, jeżyna – **7 dni**.

Uprawa w polu: truskawka, poziomka – **3 dni**; ogórek, cukinia, kabaczek, patison, melon, kawon (syn. arbuz), dynia olbrzymia jadalna – **3 dni**; papryka – **3 dni**; cebula uprawiana na szczypior, cebula siedmiolatka, szczypiorek – **7 dni**; cebula, czosnek, szalotka – **14 dni**; fasola zwykła (szparagowa), groch zielony cukrowy, pomidor i oberżyna (syn. bakłażan), karczoch zwyczajny, maliny, jeżyny – **7 dni**; brokuł zwyczajny, kalafior, marchew, pasternak, pietruszka (uprawiana na korzeń), burak ćwikłowy, chrzan pospolity, rzodkiewka, rzodkiew japońska, rzepa (biała i czarna), brukiew jadalna, salsefia, topinambur (syn. słonecznik bulwiasty), skorzonera, cykoria korzeniowa, seler pospolity, seler naciowy, kapusta pekińska, groch zielony łuskowy, fasola zwykła (uprawiana na świeże nasiona), grupa салат (sałata głowiasta, sałata liściowa, endywia), kapustne liściowe (rukola – rókietta siewna), szpinak, seler listkowy, pietruszka (uprawiana na nać), rośliny zielarskie, kwiaty jadalne – **14 dni**; por, kapusta głowiasta (biała, czerwona, włoska), kapusta brukselska, jarmuż – **21 dni**; cykoria салатowa – **30 dni**; szparagi, rośliny ozdobne – nie dotyczy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIAZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Nie zanieczyszczać wód środkami ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska. Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł.

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Syngenta Polska Sp. z o.o.,
ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa,
Tel.: 22 326-06-01, fax: 00 326-06-99

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin: TARGET S.A.

Kartoszyń, ul. Przemysłowa 5
84-110 Krokowa
tel.: 58 774 10 90, fax: 58 774 10 91
e-mail: info@target.com.pl
www.target.com.pl