

agrecol[®]
natura

PL Obornik granulowany
EN Granular manure
RO Bălegar granulat

2 kg

OBORNIK
GRANULOWANY
FERTIPLUS 4-3-3

PL **Przechowywanie:** Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu, w temperaturze od 0°C do +25°C, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w pobliżu żywności oraz pokarmu dla zwierząt.

Środki ostrożności: Nie spożywać. W razie pokłnięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnij porady lekarza. W razie przypadkowego rozsypania, nawóz zebrać na sucho, a w razie konieczności zabrudzoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody. Nawozu nie stosować na pastwiskach.

Okres przydatności do stosowania przy właściwych warunkach przechowywania – 5 lat.
Data produkcji, nr partii – na opakowaniu

EN **Storage:** Keep in an original, tightly closed container in a cold, dry, well-ventilated area, at a temperature from 0°C to +25°C, in a place out of reach of children. Keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

Precautions: Do not ingest. If swallowed, seek medical advice immediately and show this container or label. If irritation occurs, rinse skin and eyes with plenty of water and seek medical advice. In case of accidental spillage, collect the fertiliser and, if necessary rinse contaminated surface with plenty of water.

Expiration date (batch number): on the packaging
Shelf life with proper storage conditions - 5 years.

RO **Depozitare:** A se păstra în recipientul original, închis ermetic într-o zonă răcoroasă, uscată, bine ventilată, la o temperatură cuprinsă între 0°C până la + 25°C. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se păstra departe de alimente, blături și hrană pentru animale.

Măsuri de precauție: A nu se ingera. În caz de înghițire, consultați medicul medical și arătați-i recipientul sau eticheta. În caz de iritație, clătiți pielea și ochii cu multă apă, și consultați medicul. În caz de deversare accidentală, colectați îngrășământul și, dacă este cazul, spălați suprafața cu multă apă.

Data expirării / Nr. Lot: vezi pe ambalaj
Perioada de valabilitate în condițiile de depozitare adecvate - 5 ani.

Objętość netto/masa netto / Net volume/net weight / Greutate netă:
2 kg / 3,3 l

Producer/ Producent/ Producător:
Ferm-O-Feed b.v.
De Peel 1,
5411 VO Zeeland, P.O. Box 40,
5410 AA Zeeland, Holandia.
Tel.: +31(0)413 274275,
Fax: +31(0)413 274395,
Email: sales@fermofeed.com,
www.fermofeed.com

Dystrybutor/ Repacker/ Distributor:
AGRECOL Sp z o.o.
Miszewy 2
81-402 Wieruszów
Polska/ Polonia
tel.: +48 62 78 32 000
fax.: +48 62 78 44 445
informa: 62 72 08 018
www.agrecol.pl



agrecol[®]

OBORNIK
GRANULOWANY

EN Granular manure
RO Bălegar granulat

FERTIPLUS 4-3-3



100% naturalny

łatwy w użyciu

2 kg

PL **SKŁAD:**
Nawóz organiczny
4,2% azot (N) całkowity w tym:
- azot (N) organiczny 3,5%
- azot (N) amonowy 0,7%
3% fosfor całkowity w przeliczeniu na P₂O₅
2,8% potas w przeliczeniu na K₂O
1% magnez w przeliczeniu na MgO
45 mg/kg kobalt (Co) całkowity
2 mg/kg miedź (Cu) całkowita
110 mg/kg mangan (Mn) całkowity
1200 mg/kg żelazo (Fe) całkowite
480 mg/kg miedź (Cu) całkowita
11 mg/kg molibden (Mo) całkowity
420 mg/kg cynk (Zn) całkowity
65% materii organicznej

Wprowadzony na terytorium Polski na podstawie Art. 5 Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o Nawozach i Nawożeniu oraz na podstawie Pozwolenia Nr EEC NL 35706 wydanego przez Holenderski Urząd ds. Żywności i Towarów (NVWA). Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia WE nr 1069/2009. Przetworzony obornik zaliczony do mat. kategorii 2, o którym mowa w art. 9 w Rozporządzeniu (WE) nr 1069/2009.

EN **COMPOSITION:**
Organic fertiliser
4,2% - nitrogen (N) in total including:
- 3,5% of organic nitrogen (N)
- 0,7% of ammoniacal nitrogen (N)
3% - total phosphorus based on P₂O₅
2,8% - total potassium based on K₂O
1% - total magnesium based on MgO
9% - total calcium based on CaO
1200 mg/kg iron (Fe) in total
480 mg/kg manganese (Mn) in total
420 mg/kg zinc (Zn) in total
110 mg/kg copper (Cu) in total
45 mg/kg boron (B) in total
11 mg/kg molybdenum (Mo) in total
2 mg/kg cobalt (Co) in total
65% - organic matter

Authorization No. EEC NL 35706 issued by the Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA).

RO **COMPOZIȚIE:**
Îngrășământ organic
4,2% - azot (N) în total, incluzând:
- 3,5% azot organic (N)
- 0,7% azot amoniacal (N)
3% - total fosfor, pe bază de P₂O₅
2,8% - total potasiu, pe bază de K₂O
1% - total magneziu, pe bază de MgO
9% - total calciu, pe bază de CaO
1200 mg/kg de fier (Fe), în total
480 mg/kg mangan (Mn) în total
420 mg/kg de zinc (Zn) în total
110 mg/kg de cupru (Cu), în total
45 mg/kg de bor (B), în total
11 mg kg molibden (Mo), în total
2 mg/kg kobalt (Co), în total
65% - materie organică

Autorizația nr. EEC NL 35706 emisă de Oficiul Olandez pentru Alimentație și Siguranța Produselor (NVWA). Conform ghidurilor, gunoii de grajd prelucrat este inclus în categoria materialelor de categoria 2, menționate la art. 9 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009. Acesta conține în totalitate produse din anexa I la Regulamentul CE 893/2008, de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului.

2 kg



OBORNIK
GRANULOWANY
FERTIPLUS 4-3-3

PL Obornik granulowany

TYP NAWOZU – Nawóz organiczny
Nawóz organiczny, wyprodukowany na bazie obornika, przeznaczony do nawożenia warzyw, drzew, krzewów owocowych, roślin ozdobnych oraz trawników. Źródło makro- i mikrośladków niezbędnych do prawidłowego odżywiania roślin. Po zastosowaniu nawozu rośliny mają idealne warunki do bujnego wzrostu części zielonych oraz korzeni. Dzięki łatwemu przyswajaniu składników pokarmowych, rośliny są zdrowe, a plony wysokie. Po zastosowaniu nawozu trawniki stają się gęste i soczysto zielone, a rośliny ozdobne wyglądają atrakcyjnie.

Nawóz wzbogaca podłoże w materię organiczną, która przyczynia się do utrzymania wilgotności gleby i zapobiega erozji. Mikroorganizmy glebowe rozkładają materię organiczną do kwasów humusowych i aminokwasów. Proces ten wpływa pozytywnie na napowietrzenie gleby. Nawóz aktywizuje mikroorganizmy glebowe oraz przywraca glebie zrównoważone pH. Specjalny proces fermentacji i suszenia obornika prowadzi do zachowania właściwości odżywczych. Dzięki innowacyjnemu procesowi produkcji nawóz pobawiony jest nasion chwastów, patogenów i szkodników. Granulowana forma ułatwia stosowanie szczególnie w uprawach warzywnych i sadowniczych.

Stosowanie i dawkowanie:
Stosowanie posypowe: Nawóz można stosować posypowo, wiosną przed rozpoczęciem uprawy. Odpowiednią dawkę nawozu należy rozsypać i w miarę możliwości wymieszać z glebą na głębokość 10-15 cm.
Stosowanie „punktowe”: W trakcie okresu wegetacyjnego można stosować nawóz po wysadzeniu roślin. Odpowiednią dawkę nawozu należy rozsypać wokół rosnących roślin i wymieszać z glebą, tak aby nie uszkodzić korzeni.

Nawóz można stosować od wiosny do końca sezonu wegetacyjnego.
Jedna garść nawozu granulowanego to około 50-60 g.

EN Granular manure

FERTILISER TYPE – Organic fertiliser
Organic fertiliser based on a manure intended for fertilization of vegetables, trees, fruit shrubs, ornamental plants and lawns. The source of macro- and micronutrients necessary for the proper plants' development. After the fertilization the plants are provided with perfect conditions for intensive growth of green parts and roots. Thanks to its easily absorbable nutrients the plants are healthy, lawns become thick and juicy green, and ornamental plants look attractive. The fertiliser enriches a substrate with organic matter which contributes to the maintenance of soil moisture and prevents against erosion. Soil micro-organisms decompose organic matter to humic and amino acids. The process has a positive influence on the soil which is well-aerated. The fertiliser activates soil microorganisms and restore a balanced pH of soil. A special process of fermentation and airing of the manure maintains the nutrition properties. Thanks to an innovative production process, the fertiliser is free of any seed weeds, pathogens and insects. Granulated formula simplifies the use of the fertiliser particularly in vegetables cultivation.

Use and dosage:
Scattering: use in spring before planting. Mix with soil at a depth of 10-15 cm.
Spot application: During the growing season the fertiliser can be used during the planting. An appropriate dosage of fertiliser should be scattered around plants and carefully mixed with the soil. The product can be used from spring till the end of the growing season.

RO Bălegar granulat

Îngrășământ organic bazat pe gunoi de grajd destinat pentru fertilizarea legumelor, pomilor, arbuștilor fructiferi, plante ornamentale și peluze. Sursă de macro și micronutrienți necesari pentru dezvoltarea corespunzătoare a plantelor. După fertilizare, plantele au asigurate condiții perfecte pentru o creștere intensivă a părților verzi și a rădăcinilor. Datorită nutrienților săi ușor absorbabili plantele vor fi sănătoase, peluzele devin dense și verzi, iar plantele ornamentale vor fi aspectuoase.

Îngrășământul îmbogățește substratul cu materie organică, care contribuie la menținerea umidității solului și previne eroziunea. Microorganismele din sol descompun materia organică în humus și aminoacizi. Procesul are o influență pozitivă asupra solului, care este bine-aerat. Îngrășământul activează microorganismele din sol și restabilește un pH echilibrat solului.

Un proces special de fermentare și de aerisire a gunoii de grajd menține proprietățile nutriționale. Grație unui proces de producție inovativ, îngrășământul este liber de orice buruieni, semințe, agenți patogeni și insecte. Formula granulată simplifică utilizarea îngrășământului, în special în cultivarea legumelor.

Utilizare și dozaj:
Aplicare „prin împrăștiere”: se efectuează primăvara, înainte de plantare. Doza adecvată de îngrășământ, se împrăștie, și eventual se amestecă cu solul, la o adâncime de 10-15 cm.
Aplicare „pe alocuri”: În timpul sezonului de creștere îngrășământul poate fi utilizat atunci când plantele sunt plantate. Doza adecvată de îngrășământ se împrăștie în jurul plantelor și amestecat cu atenție cu solul, în așa fel încât să nu deteriorezi rădăcinile. Se poate folosi din primăvară până la sfârșitul perioadei de vegetație.

Doza de îngrășământ pentru utilizare pe sol, în medie:

DAWKOWANIE
Dawki nawozu do zastosowania na glebach o średniej zasobności w składniki pokarmowe:

Pomidor:	1,0 - 1,5 kg/10 m ² *
 Ogórek:	1,0 - 1,5 kg/10 m ² *
 Papryka:	1,0 - 1,5 kg/10 m ²
 Rośliny dyniowate:	1,0 - 1,5 kg/10 m ²
 Kapusta:	1,25 - 1,75 kg/10 m ²
 Por:	1,0 - 1,2 kg/10 m ²
 Ziemniak:	0,75 - 1,25 kg/10 m ²
 Marchew:	1,5 - 2,0 kg/10 m ²
 Rośliny ozdobne:	1,5 - 3 kg/10 m ²
 Truskawka:	2,0 - 3,0 kg/10 m ²
 Trawniki:	1,0 - 1,5 kg/10 m ²
 Winośli:	300 - 500 g/drzewo
 Drzewa owocowe:	2,0 - 5,0 kg/drzewo

*W przypadku upraw szklarniowych nawóz można stosować dwukrotnie w ciągu sezonu (dwa razy w roku). Podane wartości są dawkami bazowymi. Wysokość dawki ułożona jest od typu gleby, jej zasobności w składniki odżywcze i w wodę.

DOSAGE:

Tomato:	1,0 - 1,5 kg/10 m ² *
Cucumber:	1,0 - 1,5 kg/10 m ² *
Paprika:	1,0 - 1,5 kg/10 m ²
Cucurbits:	1,0 - 1,5 kg/10 m ²
Cabbage:	1,25 - 1,75 kg/10 m ²
Leek:	1,0 - 1,2 kg/10 m ²
Potato:	0,75 - 1,25 kg/10 m ²
Carrot:	1,5 - 2,0 kg/10 m ²
Ornamental plants:	1,5 - 3 kg/10 m ²
Strawberry:	2,0 - 3,0 kg/10 m ²
Lawn:	2,0 - 1,5 kg/10 m ²
Grapevine:	300 - 500 g/shrub
Fruit trees:	2,0 - 5,0 kg/tree

*In case of glasshouse cultivations, the fertiliser can be used twice in the growing season (harvesting twice a year). Specified quantities are basic dosages. The dosage depends on the type of soil, its richness in nutrients and water.

DOZA:
Doza de îngrășământ pentru utilizare pe sol, în medie:

Tomate:	1,0 - 1,5 kg/10 m ² *
Castraveți:	1,0 - 1,5 kg/10 m ² *
Ardei:	1,0 - 1,5 kg/10 m ²
Cucurbitaceae:	1,0 - 1,5 kg/10 m ²
Varza:	1,25 - 1,75 kg/10 m ²
Praz:	1,0 - 1,2 kg/10 m ²
Cartofi:	0,75 - 1,25 kg/10 m ²
Marocv:	1,5 - 2,0 kg/10 m ²
Plante ornamentale:	1,5 - 3 kg/10 m ²
Capșuni:	2,0 - 3,0 kg/10 m ²
Viță de vie:	300 - 500 g/butaș
Pomi fructiferi:	2,0 - 5,0 kg/pom

*In cazul cultivării în seră, îngrășământul poate fi folosit de două ori în sezonul de creștere (recoltă de două ori pe an). Cantitățile specificate sunt dozele de bază. Doza depinde de tipul de sol, bogăția în substanțe nutritive și apă.

