

3 kg

nawóz do iglaków **PRZECIW BRUNATNIENIU IGIEŁ**

agrecol®

agrecol

nawóz do iglaków
przeciw brunatnieniu igieł

PL
NAWÓZ WE
NAWÓZ K+(Mg) 6+ (16)
z mikroskładnikami pokarmowymi
do stosowania w ogrodnictwie
Skład nawozu w % (m/m):
6% – tlenek potasu (K₂O)
rozpuszczalny w wodzie
16,0% – tlenek magnezu (MgO)
rozpuszczalny w wodzie
0,04% – (B) bor całkowity
0,1% – (Cu) miedź całkowita
0,8% – (Fe) żelazo całkowite
0,17% – (Mn) mangan całkowity
0,01% – (Mo) molibden całkowity
0,035% – (Zn) cynk całkowity
Mikroskładniki pokarmowe są
rozpuszczalne w wodzie.

EN
EC FERTILISER
FERTILISER: K + (Mg) 6+ (16)
with micronutrients for use in horticulture.
Composition (% m/m):
6,0% – potassium oxide (K₂O)
soluble in water
16,0% – magnesium oxide (MgO)
soluble in water
0,04% – (B) boron total
0,1% – (Cu) copper total
0,8% – (Fe) iron total
0,17% – (Mn) manganese total
0,01% – (Mo) molybdenum total
0,035% – (Zn) zinc total
Micronutrients are water soluble

RO
ÎNGRĂȘĂMÂNT CE
ÎNGRĂȘĂMÂNT: K + (Mg) 6+ (16)
cu microelementi destinat utilizării
în grădini.
Compoziția îngrășământului în % (m/m):
6,0% – oxid de potasiu (K₂O)
solubil în apă
16,0% – oxid de magneziu (MgO)
solubil în apă
0,04% – (B) bor total
0,1% – (Cu) cupru total
0,8% – (Fe) fier total
0,17% – (Mn) mangan total
0,01% – (Mo) molibden total
0,035% – (Zn) zinc total
Toate ingredientele sunt solubile în apă.

FR
ENGRAIS CE
ENGRAIS K+(Mg) 6+(16)
avec microcomposants alimentaires
à utiliser pour le jardinage
Composition des engrais en % (m/m):
6% – oxyde de potassium (K₂O)
soluble dans l'eau
16,0% – oxyde de magnésium (MgO)
soluble dans l'eau
0,04% – (B) bore total
0,1% – (Cu) cuivre total
0,8% – (Fe) fer total
0,17% – (Mn) manganèse total
0,01% – (Mo) molybdène total
0,035% – (Zn) zinc total
Les microcomposants sont
solubles dans l'eau.

Producent / Producer / Producător / Fabricant:
AGRECOL
AGRECOL Sp. z o. o.
98-400 Wieruszów, Mieszny 2
Polska / Poland / Polonia / Pologne
tel./fax: +48 62 78 32 000, infolinia: 62 72 08 018
www.agrecol.pl

Data ważności/nr partii – na opakowaniu
Expiration date (batch number): see packaging
Data expirării / Nr. Lot: vezi pe ambalaj
Data d'expiration / numéro de lot - sur l'emballage

Masa netto / Net weight / Greutate netă / Poids net:

3 kg



agrecol®

nawóz do iglaków
**PRZECIW
BRUNATNIENIU IGIEŁ**

nawozy premium

3 kg

**EN** Conifer plant food - against needle browning**RO** Îngrășământ pentru conifere împotriva
rumenirii acelor**FR** Engrais pour conifères contre le brunissement des aiguilles

agrecol

nawóz do iglaków
przeciw brunatnieniu igieł**PL**

Brunatnienie igieł może być również spowodowane chorobami grzybowymi lub inwazją szkodników, którym nie przeciwdziała żaden nawóz. W takich przypadkach niezbędne jest zastosowanie skutecznych środków ochrony roślin. Brązowienie może być spowodowane także wymarzaniem, któremu można przeciwdziałać poprzez stosowanie nawozów jesiennych do iglaków marki Agrecol.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Chronić przed dziećmi. Nie spożywać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz opakowanie lub etykietę. W przypadku podrażnienia, skórę i oczy przemyć dużą ilością wody. W razie przypadkowego rozsypania nawozu zebrać na sucho, a w razie konieczności zabrudzoną powierzchnię spłukać dużą ilością wody. Nie przekraczać zalecanych dawek nawozu.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

EN**ATTENTION!**

Needle browning can also be caused by fungal diseases or pest infestation that no plant food counteracts. In such cases, it is necessary to use effective plant protection products. Browning can also be caused by freezing, which can be countered by applying Agrecol's autumn plant foods for conifers.

PRECAUTIONS:

Keep away from children. Do not ingest. If swallowed, seek medical advice immediately - show the packaging or label. Avoid contact with skin and eyes. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. After contact with skin, wash immediately with plenty of water. In case of accidental spillage collect the fertiliser and, if necessary rinse contaminated surface with plenty of water. Do not exceed the recommended dose of fertiliser.

STORAGE:

Store in the original, tightly closed container in a dry room. Do not store together with food, drink and animal feed.

RO**ATENȚIE!**

Rumenirea acelor poate fi cauzată, de asemenea, de boli fungice sau de infestarea cu dăunători, pe care nici un îngrășământ nu le contracțază. În astfel de cazuri, este necesar să se utilizeze produse eficiente de protecție a plantelor. Rumenirea poate fi cauzată și de îngheț, care poate fi combătută prin aplicarea îngrășămintelor pentru conifere Agrecol de toamnă.

PRECAUȚII:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu înghițiți. Dacă înghițiți, cereți imediat sfatul medicului - arătați-i ambalajul sau eticheta. Evitați contactul cu pielea și ochii. În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și solicitați sfatul medicului. După contactul cu pielea, spălați imediat cu multă apă. În caz de vânzare accidentală, strângeți îngrășământul și, dacă este necesar, clătiți suprafața contaminată cu multă apă. Nu depășiți doza recomandată de îngrășământ.

DEPOZITARE:

Depozitați-l în ambalajul original, bine închis, într-un loc uscat. Nu depozitați alături de alimente, băuturi și hrană pentru animale.

FR**REMARQUE!**

Le brunissement des aiguilles peut également être causé par des maladies fongiques ou une invasion de ravageurs qu'aucun engrais ne peut combattre. Dans de tels cas, il est nécessaire d'utiliser des produits de protection de plantes efficaces. Le brunissement peut être aussi provoqué par des gèlées qui peuvent être contrées par l'utilisation des engrais d'automne de la marque Agrecol pour les conifères.

PRÉCAUTIONS:

Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas manger. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin - montrer l'emballage ou l'étiquette. En cas d'irritation, laver la peau et les yeux avec beaucoup d'eau. En cas de versement accidentel d'engrais, ramasser à sec et, si nécessaire, rincer les surfaces sales avec beaucoup d'eau. Ne pas dépasser les doses d'engrais recommandées.

STOCKAGE:

Conserver dans le récipient d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec. Ne pas stocker avec la nourriture, les boissons ni les aliments pour animaux.

agrecol®

nawóz do iglaków
przeciw brunatnieniu igieł**PL**Nawóz do iglaków
przeciw brunatnieniu igieł**EN**Conifer plant food
- against needle browning**RO**Îngrășământ pentru
conifere împotriva
rumenirii acelor**FR**Engrais pour conifères
contre le brunissement
des aiguilles

• DZIAŁA INTERWENCYJNE I ZAPOBIEGAWCZO
• SKUTECZNIE UZUPEŁNIA NIEDOBÓRY MAGNEZU
• PRZECIWDZIAŁA ZAMIERANIU
I OPADANIU IGIEŁ
• WZMACNIA ODPORNOŚĆ NA CHOROBY

Najwyższej jakości, doskonale przyswajalny nawóz przeciwdziałający brunatnieniu drzew i krzewów iglastych. Zawarty w nawozie magnez i potas, w pełni pokrywają zapotrzebowanie roślin na te pierwiastki. Prawidłowo stosowany, natychmiastowo hamuje proces brązowienia igieł oraz zapobiega obumieraniu pędów. Systematyczne nawożenie zapewnia właściwe wybarwienie igieł oraz przywraca prawidłową kondycję iglakom. Specyfika nawozu sprawia, że działa on szybko i efektywnie. Dzięki granulowanej formie jest wygodny w stosowaniu, wydajny, a także bezpieczny dla środowiska. Można go stosować jednocześnie z innymi nawozami lub odżywkami w postaci stałej lub płynnej. Nawóz nie zawiera azotu więc można go stosować przez cały sezon.

• STABILIZES NEEDLES COLOR
• COMPLETES MAGNESIUM
• PREVENTS FROM NEEDLE FALLING
• STRENGTHENS RESISTANCE TO DISEASES

Highest-quality, anti-browning fertilizer with quick absorption of nutrients. Formulated to feed trees and shrubs. Magnesium and potassium contained in the plant food, fully cover the needs of the plants for these elements. Properly applied, it immediately stops the process of browning of needles and prevents the withering away of the sprigs. Regular fertilization ensures proper needles color and restore the appropriate condition of the conifers. The specificity of the plant food makes it comfortable to use, efficient and safe for the environment. The plant food does not contain nitrogen, so it can be used throughout the season.

• ACȚIUNE PREVENTIVĂ ȘI INTERVENȚIONALĂ
• COMPLETEAZĂ EFICIENT DEFICIENȚA MAGNEZIULUI
• PREVINȚE CĂDEREA ACELOR
• CREȘTE REZISTENȚA ÎMPOTRIVA BOLILOR

Îngrășământ anti-rumenire de cea mai bună calitate, perfect asimilabil de către plante. Conținutul de magneziu și potasiu din îngrășământ, acoperă pe deplin nevoile plantelor pentru aceste elemente. Aplicat corect, oprește imediat procesul de rumenire a acelor și împiedică ofițirea ramurilor. Fertilizarea regulată asigură culoarea corectă a acelor și asigură o stare corespunzătoare plantelor. Specificitatea îngrășământului face ca acesta să funcționeze rapid și eficient. Prin forma sa granulară este ușor de utilizat, eficient și sigur pentru mediu. Îngrășământul nu conține azot, astfel poate fi aplicat pe tot parcursul sezonului.

• IL STABILISE LA COULEUR CORRECTE DES AIGUILLES
• ACTION D'INTERVENTION ET DE PREVENTION
• IL COMPLETE EFFICACEMENT LES CARENCES EN MAGNESIUM
• IL RENFORCE LA RESISTANCE AUX MALADIES

Engrais de la plus haute qualité, parfaitement assimilable, agissant contre le brunissement des arbres et arbustes conifères. Le magnésium et le potassium contenus dans l'engrais couvrent entièrement la demande des plantes en ces éléments. Concrètement, il freine immédiatement le brunissement des aiguilles et empêche l'atrophie des pousses. Un fumage systématique assure la couleur adéquate des aiguilles et rétablit le bien-être des conifères. La spécificité de l'engrais lui permet d'agir rapidement et efficacement. Grâce à sa forme granulaire, il est pratique à utiliser, efficace et sans danger pour l'environnement. Il peut être utilisé simultanément avec d'autres engrais ou nutriments sous forme friable ou liquide. L'engrais ne contient pas d'azote, il peut donc être utilisé tout au long de la saison.

KALENDARZ STOSOWANIA
Stosować od marca do października,
co 45-60 dni



APPLICATION CALENDAR
Apply from March to October, every 45-60 days.

CALENDARUL DE UTILIZARE
Aplicați din martie până în octombrie,
la fiecare 45-60 de zile.

CALENDRIER D'APPLICATION
Utiliser de mars à octobre, tous les 45 à 60 jours.

**SPÓŚÓB STOSOWANIA:**

1 Odmierz odpowiednią ilość nawozu, w zależności od wieku i typu rośliny:
• młode rośliny (do 0,5 m wysokości) – zastosuj 20-30 g nawozu,
• starsze rośliny – zastosuj 30-40 g nawozu na każdy 1 m wysokości rośliny,
• rośliny płazące – nawóz w zależności od rozdroźności krzewu.

2 Rozsyp nawóz równomiernie wokół rośliny i w miarę możliwości wymieszaj z wierzchnią warstwą gleby.

3 Po zastosowaniu nawozu, roślinę obficie podlej wodą.

METHOD OF APPLICATION:

1 Measure proper dose:
• young plants (up to 0.5 m height) - apply 20-30 g,
• older plants - apply 30-40 g counted for every 1 m of plant height,
• creeping plants - depending on the bush size.

2 Spread evenly around the plant and mix with the top soil.

3 After the application - water the plant.

MODUL DE UTILIZARE:

1 Măsurati cantitatea corespunzătoare de îngrășământ, în funcție de vârsta și tipul plantei:
• plante tinere (până la 0,5 m înălțime) - aplicați 20-30 g de îngrășământ,
• plante mature - aplicați 30-40 g de îngrășământ pentru fiecare metru din înălțimea plantei.

2 Împrăștiati îngrășământul în mod uniform în jurul plantei și dacă este posibil, amestecați-l cu stratul superior al solului.

3 După aplicarea îngrășământului, udați cu multă apă.

MODE D'APPLICATION:

1 Mesurez une quantité d'engrais appropriée, en fonction de l'âge et du type de plante:
• plantes jeunes (jusqu'à 0,5 m de hauteur) - appliquez 20-30 g d'engrais;
• plantes plus grandes - appliquez de 30 à 40 g d'engrais pour chaque mètre de hauteur de la plante;
• plantes rampantes - fumez en fonction de la ramosité de l'arbuste.

2 Étalez l'engrais uniformément autour de la plante et mélangez autant que possible avec la couche supérieure de la terre.

3 Après l'application de l'engrais, arrosez la plante abondamment d'eau.

1 poignée = environ 30 - 40 g d'engrais

3 kg → 75 - 100 roślin / plants / plante / plantes

agrecol®

nawóz do iglaków
przeciw brunatnieniu igieł