



SPRAWDŹ



 **SPRAWDŹ** **NAWÓZ DO**
KWIATÓW
BALKONOWYCH



ŁATWO ROZPUSZCZALNY



SUPER WYDAJNY



SZYBKI EFEKT NAWOŻENIA

na **300 L**
wody

NAWÓZ DO KWIATÓW BALKONOWYCH

TERMIN STOSOWANIA:

TERMINY STOSOWANIA:
Od kwietnia do sierpnia co dwa, trzy tygodnie.



 najlepszy termin nie stosować

STOSOWANIE:

W zależności od kondycji roślin rozpuścić od 2,5 do 10 g nawozu w 5 l wody (5 g odpowiada przeciętnej łyżeczce).
Uwaga! Stosować dogłębowo. Najlepiej rozpuścić w letniej wodzie.

SPOSÓB STOSOWANIA:



INNE ZALECENIA:

Nie przekraczać dawki 5 g/m² powierzchni. Niższe z zalecanych dawek stosować dla roślin wrażliwych na zasolenie. Powyższe zalecenia dotyczący nawożenia są ogólne i odnoszą się do średniej wielkości okazów roślin. Częstotliwość stosowania oraz dawka nawozu powinny być zawsze dobrane do indywidualnych potrzeb rośliny oraz warunków uprawy. Producent odpowiada wyłącznie za deklarowany skład nawozu i nie może ponosić odpowiedzialności za działania użytkownika będące naruszeniem zasad dobrej praktyki uprawy roślin.

WIELOSKŁADNIKOWY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
NPK (Mg) nawóz mineralny zawierający mikroskładniki pokarmowe, 16-5-25 (+3,4)

16 % (m/m) **CAŁKOWITENNY AZOTU** (N); 10,4 % (m/m) azotu azotanowego; 5,2 % (m/m) azotu amonowego; 0,4 % (m/m) azotu amidowego; 5 % (m/m) **CAŁKOWITENNY PIĘCIOTLENKU FOSFORU** (P₂O₅); 5 % (m/m) rozpuszczonego w wodzie pięciotlenku fosforu (P₂O₅); 5 % (m/m) pięciotlenku fosforu (P₂O₅) rozpuszczonego w obojętnym roztworze cytrynianu; 25 % (m/m) **TLENKU POTASU** (K₂O) rozpuszczonego w wodzie; 3,4 % (m/m) **TLENKU MAGNEZU** (MgO) rozpuszczonego w wodzie

Niska zawartość chlorków

Z mieszania mikroskładniki pokarmowe całkowicie rozpuszczalne w wodzie:

0,010 % (m/m) boru (B) w postaci kwasu borowego; 0,010 % (m/m) miedzi (Cu) schelatowanej przez EDTA; 0,100 % (m/m) żelaza (Fe) schelatowanego przez EDTA; 0,040 % (m/m) manganu (Mn) schelatowany przez EDTA; 0,001 % (m/m) molibdenu (Mo) w postaci sodu; 0,010 % (m/m) cynku (Zn) schelatowanego przez EDTA

Zakres pH gwarantujący stabilność obecnych chelatów: Cu 1,5-10; Fe 1,5-6,5; Mn 3-10; Zn 2-10.

ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza.

W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Instrukcje dotyczące zastosowania, w tym dawki: 0,5-2,0 g/L w wodzie do podlewania

UWAGA: H272: Może intensyfikować pożar; utleniacz. H318: Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

WYPOK: PIERZEC, wioze mienyszkodny pozdr, ujemnicz, [486-16]. Powoduje powazne uszkodzenie bczd.
Powaga Nierzetelno zwiazki [7778-805]. Fosforan moczniaka [1816-192]. P210: Przechowywac z dala od
 zdroj ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskry, materiałów ognia i innych źródeł zapaleni. Nie palić.
 P220: Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych. P280: Stosować rękawiczki ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA
 DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je
 usunąć. Nadal płuca. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Granulometria: Mieszanaka proszku i bryłek. 68% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1 mm, a pozostałe 32% przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 5 mm.

Składniki: Azotan amonowy (CMC1) nr CAS [6484-52-2]; Fosforan monoamonowy (CMC1) nr CAS 7722-76-1;

azotan potasu [7757-79-1]; **Siarczan magnezu** (CMC1) nr CAS [7487-88-9]. CMC1- Pierwotne surowce i mieszaniny

Okres przydatności do stosowania: 5 lat

Data produkcji: na opakowaniu

Producător: _____ Distribuitor: _____ data producției și numărul părții: _____

verris International B.V.
Nijwerheidsweg 1-5
4222 PD Heerlen
olandia



**Masa netto
nawozu:**
150 g



INNE

TARGET.COM.PL *sposób na zadbane ogród*