



agrecol[®]

z apteki ogrodnika



AVANS RTU[®]

zwalcza
**NIECHCIANE
ROŚLINY**

wraz z korzeniami



500 ml

syngenta[®]



UWAGA! NISZCZY WSZYSTKIE ROŚLINY

OPRYSK

agrecol®

AVANS RTU®

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

- szybko działa
- niszczy także korzenie
- deszcz w ciągu 1 h po zabiegu nie obniża skuteczności

Zawartość substancji czynnej: glifosat w formie soli amonowej (związek z grupy kwasu aminofosforowego) – 8,39 g/l (0,84%)

Zezwolenie MRiRW nr R-37/2016 z dnia 08.02.2016 r.

ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R - 885/2020d z dnia 03.12.2020 r.

OPIS DZIAŁANIA Avans RTU jest środkiem chwastobójczym do bezpośredniego stosowania, w formie koncentratu rozpuszczalnego, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich). Środek do stosowania amatorskiego wokół domu i w ogrodach przydomowych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Avans RTU jest dolistnym środkiem chwastobójczym o działaniu układowym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrzewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 24 godzin, a następnie zamieranie roślin. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i wędnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. **Chwasty wrażliwe:** bylica pospolita, komosa biała, koniczyzna biała, mietlica rozłogowa, mlecz polny, mlecz kolczasty, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, powój polny, przetacznik perski, przymiotno kanadyjskie, rdest plamisty, starzec zwyczajny, szczyr roczny, wiechliczna łąkowa, wiechliczna roczna, wilczomlecz obrotny, wyczyniec polny, życica trwała. **Chwasty średnio wrażliwe:** gwiazdnica pospolita, perz zwyczajny, pokrzywa zwyczajna, kupkówka pospolita, rdest ptasi, rumianek pospolity.

EUH208 - Zawiera 1,2-benzotiazol-3(2H)-on.
Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
EUH401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
AGRECOL Spółka z o.o., Mesznary 2,
98-400 Wieruszów, tel. 62 78 32 000
e-mail: agrecol@agrecol.pl, www.agrecol.pl

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
AGRECOL Spółka z o.o., Mesznary 2, 98-400 Wieruszów,
tel. 62 78 32 000, e-mail: agrecol@agrecol.pl

Okres ważności – 2 lata.

Data produkcji i nr partii:

Zawartość netto:

500 ml 5 902341 101772

Posiadacz zezwolenia:
Syngenta Polska Sp. z o.o.,
ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa
tel.: 22 326 06 01, fax: 22 326 06 99.

**zobacz
więcej**



STOSOWANIE ŚRODKA

Nie stosować środka ochrony roślin w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej.

A. Teren nieprzeznaczony pod uprawę (ścieżki, drogi dojazdowe, podwórka, patia itp.). Termin stosowania: Środek stosować w okresie wegetacji, po pojawieniu się chwastów.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m². Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

1. B. Ścieżki i place z nasadzeniami drzewiastych roślin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia). Termin stosowania:

Środek stosować w okresie wegetacji, po pojawieniu się chwastów.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m². Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

1. C. Nieużytkowane rabaty przeznaczone pod uprawę roślin ozdobnych.

Termin stosowania: Środek stosować w okresie wegetacji, po pojawieniu się chwastów, ale przed planowaną uprawą. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m². Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

1. D. Trawniki (likwidacja lub odnowienie). Termin stosowania: Środek stosować w okresie wegetacji, najpóźniej na dwa dni przed planowanym wysiewem lub sadzeniem roślin następczych. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m². Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

1. E. Rośliny ozdobne (drzewa i krzewy co najmniej po roku od zasadzenia). Termin stosowania: Środek stosować wokół nasadzeń, wiosną lub latem po wschodach chwastów. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m². Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

1. F. Rośliny sadownicze. Drzewa ziarnkowe i drzewa pestkowe (co najmniej po roku od zasadzenia). Termin stosowania: Środek stosować wokół nasadzeń, wiosną lub latem po wschodach chwastów. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m². Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

1. G. Rośliny sadownicze. Drzewa owocowe i krzewy owocowe (co najmniej po roku od zasadzenia). Termin stosowania: Środek stosować wokół nasadzeń, wiosną lub latem po wschodach chwastów. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m². Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

1. H. Rośliny sadownicze. Krzewy owocowe i drzewa owocowe (co najmniej po roku od zasadzenia). Termin stosowania: Środek stosować wokół nasadzeń, wiosną lub latem po wschodach chwastów. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m². Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

1. I. Rośliny sadownicze. Drzewa i krzewy (co najmniej po roku od zasadzenia). Termin stosowania: Środek stosować wokół nasadzeń, wiosną lub latem po wschodach chwastów. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m². Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

1. J. Rośliny sadownicze. Drzewa i krzewy (co najmniej po roku od zasadzenia). Termin stosowania: Środek stosować wokół nasadzeń, wiosną lub latem po wschodach chwastów. Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 270 ml/10 m². Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA Środek stosować:

- od kwietnia do listopada, w bezwietrzne i bezdeszczowe dni, przy temperaturze 10-20°C,

- po wschodach chwastów, w okresie ich intensywnego wzrostu, gdy mają dobrze wykształconą zieloną powierzchnię. Przed zastosowaniem wstrząsnąć opakowaniem. Opryskiwać aż chwasty będą wilgotne, ale unikać spływania cieczy z roślin. Zaleca się pozostawić opryskane chwasty na okres minimum 7 dni przed rozpoczęciem prac uprawowych. Nie stosować na trawniki oraz inne rośliny, które nie są celem zwalczania. Zachować szczególną ostrożność przed znoszeniem cieczy użytkowej, ponieważ środek niszczy wszystkie zielone części roślin, w tym trawę. Środek stosować w bezpiecznej odległości od roślin jadalnych i innych roślin, które nie są celem zwalczania np. pełniących rolę żywopłotów. Nie stosować częściej niż 1 raz w roku.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. **Środki ostrożności dla osób stosujących środek:** Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne. Umyć ręce i zanieczyszczoną skórę po użyciu produktu. **Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:** Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka. **Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):** nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. **Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):** nie dotyczy. **Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):** nie dotyczy. **Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następnie:** 7 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: – w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, – w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, – w szczelnie zamkniętym opakowaniu, – w temperaturze 0 - 30°C. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów. Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradzić się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC. Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Telefony alarmowe producenta: w Wielkiej Brytanii:

+44,1,484 538-444; w Polsce: (22) 3260-777, 3416-777.