

64,3 mm

107,7 mm

florovit®



80235vCE01

**na 50 litrów
roztworu**

**długie i obfite
kwitnienie**

**intensywny wzrost
i silne pędy**

**nawóz do
surfinii**

x – 64,3 mm
y – 107,7 mm



nawóz płynny do surfinii

Sposób użycia: Stosować 10 ml nawozu na 1,2 l wody. Podlewać rośliny 3 razy w tygodniu od kwietnia do października. Nie dopuszczać do przesychania podłoża. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

PLYNNY NAWÓZ MINERALNY (PFC 1 (C)(I)(b)(II))
Nawóz NPK 6-6-6/6-2,6-4,9 z mikroskładnikami

SKŁAD NAWOZU: 6% AZOT CAŁKOWITY (N); 1,8% azot azotanowy; 1,3% azot amonowy; 2,9% azot mocznikowy; 6% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5); 6,0% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5); 6% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K_2O). Mikroskładniki całkowicie rozpuszczalne w wodzie: 0,02% bor (B), jako sól sodowa; 0,008% miedź (Cu), jako siarczan, 0,008% schelatowana przez EDTA; 0,10% żelazo (Fe), jako siarczan, 0,10% schelatowane przez EDTA; 0,015% mangan (Mn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA; 0,002% molibden (Mo), jako molibdenian amonu; 0,015% cynk (Zn), jako siarczan, 0,015% schelatowany przez EDTA. Akceptowalna stabilność frakcji schelatowanej w zakresie pH 3–7.

Składniki: azotan potasu¹ (CAS 7757-79-1), diwodorooortofosforan amonu¹ (CAS 7722-76-1), mocznik² (CAS 57-13-6), gdzie ¹ oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny. Nawóz płynny w postaci roztworu.

Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.

40 ml na 4,8 L

30 ml na 3,6 L

20 ml na 2,4 L

10 ml na 1,2 L



Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zawiera oktylinon. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. W przypadku rozlania spłukać dużą ilością wody. Nawóz może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. Należy stosować w umiarkowanej temperaturze otoczenia. Chronić przed mrozem i nagrzaniem, przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach w temp. 5–40°C.

Data ważności na opakowaniu.



0,55 kg
masa netto

80351vCE01



GRUPA INCO S.A.

ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax +48 55 242 75 00

florovit.pl

UFI:X2FS-Q125-N001-1E01

5

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0