

333 216



Florovit przeciwko brązowieniu igieł

NAWÓZ MINERALNY (PFC 1(C)(I)(a)(ii))
Nawóz Mg-S 16-32 / 9,6-12,8

SKŁAD NAWOZU: 16,0% rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu (MgO); 32,0% rozpuszczalny w wodzie trójtlenek siarki (SO₃).

Składniki: siarczan (VI) magnezu¹ (CAS 7487-88-9), gdzie ¹ oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny. Granulometria: Granule. 75 % granul w postaci kryształków przechodzi przez sito 1 mm.

Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.

Chronić przed dziećmi. W przypadku silnego pylenia i dłuższego kontaktu z nawozem należy nałożyć maskę przeciwpyłową, okulary ochronne i rękawice gumowe. W przypadku połknięcia wypić dużą ilość wody i skontaktować się z lekarzem. W przypadku dostania się do oczu przemyć dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie nie ustępuje skontaktować się z lekarzem.

W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania. Rozsypany nawóz dokładnie zebrać, pozostałość zmyć wodą.



PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM POMIESZCZENIU W ORYGINALNYCH ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH.

Data ważności na opakowaniu.

GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax +48 55 242 75 00
florovit.pl



masa netto **1 kg**

Nawóz przeciwko brązowieniu igieł

nawóz krystaliczny

florovit

nr1
w Polsce

LAUR
KONSUMENTA
2021



wystarcza
na około 40 m²

Nawóz przeciwko
brązowieniu
igieł

przeciwdziała
brązowieniu igieł

zapobiega niedoborom
magnezu

1 kg

50088vCE01

Wypróbuj!
Inne nawozy Florovit:



do róż



do trawników



do iglaków

Florovit nr 1 – najbardziej znana w Polsce marka nawozów do roślin. Badanie Millward Brown 2018

nawóz krystaliczny

florovit

Magnezowy nawóz
ogrodniczy przeciwko
brązowieniu igieł.

Magnezowy nawóz krystaliczny – łatwo rozpuszczalny w wodzie nawóz, zawierający magnez w formie szybko przyswajalnej przez rośliny. Stosowanie nawozu zapobiega często występującym niedoborom tego ważnego składnika pokarmowego.

Regularne stosowanie nawozu:

- zapobiega brązowieniu igieł,
- eliminuje ryzyko niedoboru magnezu u roślin.



Jedną z najczęstszych przyczyn obumierania drzew i krzewów roślin iglastych jest niedobór składników pokarmowych. Po pewnym czasie od posadzenia następuje zmiana koloru igieł do jasnozielonego, następnie żółtego, w końcu igły brunatnieją i opadają. Opisane objawy są skutkami niewłaściwego zaopatrzenia w składniki pokarmowe – najczęściej występuje niedobór magnezu. Ponieważ przyswajalność składników z gleby zmniejsza się bardzo w glebie suchej, opisane objawy niedoboru najczęściej widoczne są w okresach suszy. Niedoborom magnezu można łatwo zapobiegać poprzez stosowanie nawozu *Florovit przeciwko brązowieniu igieł*.

Wskazówki:

- Wymieszanie z glebą/podłożem polepsza skuteczność działania nawozu.
- Nie stosować nawozu w formie oprysków dolistnych w czasie silnego nasłonecznienia oraz podczas silnego wiatru.
- Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.

SPOSÓB STOSOWANIA

Rośliny iglaste

Doglebowo

Zalecaną dawkę nawozu rozsypać równomiernie pod koroną drzew lub krzewów. Następnie należy rośliny obficie podlać. Nawóz można stosować w miarę potrzeb przez cały okres wegetacji. Szczególnie wskazane jest stosowanie nawozu w momencie pojawienia się pierwszych objawów brunatnienia igieł.

Wielkość drzewa lub krzewu	Zalecana dawka
do 1 m	25 g/m ²
od 1 m do 2 m	50 g/m ²
od 2 m do 5 m	100 g/m ²
od 5 m do 10 m	150 g/m ²
powyżej 10 m	200 g/m ²

Dolistnie

Nawóz można stosować również w formie oprysków dolistnych. Do tego zabiegu zaleca się ok. 5% roztwór nawozu (500 g nawozu na 10 l wody). Przy silnym niedoborze zabieg należy powtórzyć 2–3 razy w odstępach 14–dniowych.

Wszystkie rośliny, u których występuje
ryzyko niedoboru magnezu

Doglebowo

Zalecaną dawkę nawozu rozsypać równomiernie pod koroną drzew lub krzewów. Następnie należy rośliny obficie podlać. Nawóz można stosować w miarę potrzeb przez cały okres wegetacji.

Przedwegetacyjnie	25 g/m ² , nawóz wymieszać z 10–20 cm warstwą gleby
Pogłównie	posypowo 10 g/m ² lub dolistnie opryskać rośliny 5% roztworem, 50–100 ml/m ²

Podane dawki produktu są zaleceniami.

łyżka stołowa zawiera ok. 15 g nawozu



57

138

58

138

408