

MLECZ

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY

Środek zawiera substancje czynne z grupy regulatorów wzrostu. Środek pobierany jest przez liście chwastów. W roślinie powoduje zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg, zahamowania wzrostu, karłowacenia, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania roślin. Środek najlepiej stosować gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie siewki do fazy 6 liści właściwych. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach, a proces obumierania następuje po upływie 7 dni od zastosowania. Warunki sprzyjające wzrostowi i rozwojowi roślin, tj. temperatura powyżej 12°C, odpowiednia wilgotność gleby, światło słoneczne wzmagają skuteczność działania środka. Deszcz w ciągu 24 godzin od zabiegu zmniejsza skuteczność działania środka (zmywanie).

Zawartość substancji czynnych:

2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 70 g/l (6,59 %); MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 70 g/l (6,59%); mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów) – 42 g/l (3,95%); dikamba (związek z grupy fenoksykwasów) – 20 g/l (1,88%).

STOSOWANIE ŚRODKA


Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Trawniki

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 ml środka / 10 l wody / 100 m².

Termin stosowania:

Środek można stosować w czasie całego okresu wegetacji traw (od kwietnia do połowy września), w okresie intensywnego wzrostu chwastów. Zabieg najlepiej wykonać gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie siewki do fazy 6 liści właściwych. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
Zalecana ilość wody: 10 l/100 m².
Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.



**PRZESTRZEGAJ ETYKIETY ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN
W CELU OGRANICZENIA RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA.**

MLECZ

zwalcza chwasty na TRAWNIKACH

DAWKOWANIE

75 ml środka w 10 l wody
na 100 m²



mniszek



koniczyna biała



stokrotka polna



babka zwyczajna

OPIS DZIAŁANIA

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego (SL). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne wchodzące w skład środka zaliczane są do grupy O.

**Pełny tekst etykiety środka dołączony jest do opakowania.
Przed użyciem środka należy zapoznać się z jej treścią.**

 **agrecol**
z apteki ogrodnika

zwalcza chwasty na

TRAWNIKACH

250 ml

MLECZ

 **agrecol**
z apteki ogrodnika

MLECZ

zwalcza chwasty na

TRAWNIKACH



**MNISZEK, KONICZYNA BIAŁA, BABKA
ZWYCZAJNA I INNE**

250 ml

MLECZ

MLECZ

Posiadacz zezwolenia:

Arysta LifeScience Benelux SPRL
Rue de Renory 26/1
B-4102 Ougrée (Seraing), Królestwo Belgii
tel.: +32 4 385 97 11, fax: +32 4 385 97 49

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

UPL Polska Spółka z o.o.
ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa
tel.: +48 22 434 00 90
e-mail: sekretariat@upl-ltd.com



Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie

i etykietowanie środka ochrony roślin:
Agrecol Sp. z o.o.
Mesznary 2, 98-400 Wieruszów
tel.: +48 62 783 20 00, fax: +48 62 784 44 45
e-mail: agrecol@agrecol.pl



Uwaga



Zezwolenie MRiRW nr R-125/2013bc z dnia 14.10.2013 r.
odnowione decyzją MRiRW nr R-135/2018d z dnia 17.04.2018 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW nr R-192/2020d
z dnia 19.03.2020 r.

Zawartość netto: 250 ml

Okres ważności: 2 lata.
Data produkcji i nr partii:



5 902341 101949 >