



Działka drażniąco na oczy. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne/dzień ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Myć dużą ilością wody z mydłem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zabrać porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieść wózek.



UWAGA

STA EW100K/2210

Zawartość substancji czynnych:
fluoksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) w postaci estru (fluoksypyr metylu) – **40 g/l** (3,66%)
chloryalid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego) w postaci soli monoetanoloaminowej – **20 g/l** (1,83%)
MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) w postaci soli potasowej – **200 g/l** (18,34%)

Data produkcji i nr partii: na opakowaniu
Okres ważności: **2 lata**

DRUK:
MULTI-DRUK
Kartoszyño
tel. (058) 774 10 92



na
10 L
wody



SPRAWDZ
JAK



CHWASTY NA TRAWNIKU



babka zwyczajna



mniszek pospolity




stokrotka pospolita

STARANE® TRAWNIKI

100 ml



100 ml netto:



ZWALCZA CHWASTY NA TRAWNIKU

Działanie na chwasty

Środek działa układowo. Pobierany jest przez liście i przemieszczany do korzeni chwastów, powodując **zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin**. Pierwsze objawy na chwastach wrażliwych pojawiają się po upływie 1-2 dni. Wzrost chwastów zostaje zahamowany i chwasty zamierają po upływie 3-4 tygodni. Środek działa najskuteczniej po zastosowaniu w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Chwasty wrażliwe:

babka lancetowata – wrażliwa tylko przy dawce 4 l/ha, babka zwyczajna gwiazdnica pospolita, konieczyna biała, maruna bezwonna, mniszek pospolity, przytulia czepna, stokrotka pospolita, niezapominajka polna, szczaw tępo listny.

Środek stosować podczas dobrej pogody, na wilgotną glebę od wiosny do wczesnej jesieni w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Wyższą z zalecanych dawek środka stosować na chwasty w starszych fazach rozwojowych oraz w przypadku silnego zachwaszczenia zwłaszcza babkami i mniszkiem pospolitym.

Nie stosować trawy pochodzącej z 3 kolejnych koszeń trawnika po zastosowaniu herbicydu Starane Trawniki do kompostowania oraz do ściółkowania jakichkolwiek roślin uprawnych, ozdobnych, krzewów i drzew.