35 mm | 145 mm | 25 mm | 374 mm | 25 mm | 140 mm | 25mm | 15 mm

70 mm

W-010 - worek 10 kg

Wypróbuj inne nawozy Florovit:

do truskawek | Ogród Complex | do winorośli

Florovit nawóz do borówek i innych roślin kwaśnolubnych

NAWÓZ MINERALNY (PFC 1(C)(I)(a)(ii)) Nawóz kompleksowy NPK (Mg)
12,0–6,0–13,0 (2,6) / 12,0-2,6-10,8 (1,5) z mikroskładnikami

SKŁAD NAWOZU: 12,0% AZOT CAŁKOWITY (N); 12,0% azot amonowy; 6,0% CAŁKOWITY PIĘCIOTLENEK FOSFORU (P_2O_5); 3,9% rozpuszczalny w wodzie pięciotlenek fosforu (P_2O_5); 6,0% pięciotlenek fosforu (P_2O_5) rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu; 13,0% ROZPUSZCZALNY W WODZIE TLENEK POTASU (K_2O); 2,6% CAŁKOWITY TLENEK MAGNEZU (MgO); 2,6% rozpuszczalny w wodzie tlenek magnezu (MgO); 0,05% bor (B), jako kwas, rozpuszczalny w wodzie; 0,100% miedź (Cu), jako siarczan, całkowita; 0,50% żelazo (Fe), jako siarczan, całkowite; 0,27% mangan (Mn), jako siarczan, całkowity; 0,005% molibden (Mo), jako molibdenian amonu, rozpuszczalny w wodzie; 0,040% cynk (Zn), jako siarczan, całkowity.

Składniki: siarczan (VI) amonu[11] (CAS 7783-20-2), siarczan (VI) dipotasu[1] (CAS 7778-80-5), fosforan amonu[1] (CAS 7783-28-0), siarczan (VI) magnezu[1] (CAS 7487-88-9), gdzie [1] oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny, [11] oznacza CMC 11 – produkty uboczne w rozumieniu dyrektywy 2008/98/WE.
Granulometria: Granule. 90% produktu przechodzi przez sito 5 mm.

Dla ogrodnictwa i upraw hobbystycznych.

Niska zawartość chlorków.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Rozsypany nawóz dokładnie zebrać, pozostałość zmyć wodą. W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania.

Wskazówki:
- Wymieszanie granulatu z glebą/podłożem polepsza skuteczność działania nawozu.
- Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.
- Nawozy należy rozsiewać na powierzchni odpowiadającej średnicy korony krzewów.

Pełna szklanka zawiera ok. 240 g nawozu

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Podane dawki produktu są zaleceniami.

CE

PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM POMIESZCZENIU W ORYGINALNYCH ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH.

Data ważności na opakowaniu.

GRUPA INCO

GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax +48 55 242 75 00
florovit.pl

00389•CE02
5 900498 027105

11 10 | 9 8 | 4 LDPE

masa netto 10 kg

mikrogranulat

florovit®

nawóz do borówek i innych roślin kwaśnolubnych

wystarcza nawet na 500 m²

duże owoce, obfite plony

właściwy, kwaśny odczyn podłoża

10 kg

mikrogranulat

florovit®

Granulowany, kompleksowy nawóz ogrodniczy do borówek i innych roślin kwaśnolubnych (różaneczniki, azalie, wrzośce, paprocie i iglaki).



Nawóz kompleksowy – nawóz, w którym każda granulka zawiera wszystkie składniki niezbędne dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Nawozy kompleksowe dają pewność równomiernego dostarczania roślinom wszystkich składników pokarmowych.

Florovit do borówek zakwasza glebę, co wyraźnie sprzyja wzrostowi i rozwojowi roślin wymagających stanowiska o niskim odczynie podłoża. Magnez oraz dobrane w specjalnych proporcjach żelazo, cynk i miedź zapobiegają żółknięciu liści w okresie wegetacji roślin.

Regularne stosowanie nawozu:

zapewnia właściwy, kwaśny odczyn podłoża | zapobiega żółknięciu liści w okresie wegetacji | gwarantuje prawidłowy wzrost i rozwój roślin

SPOSÓB STOSOWANIA

Borówki

Nawóz, po rozsypaniu wokół rośliny, należy zmieszać z wierzchnią warstwą gleby tak, aby nie uszkodzić korzeni. Zalecane jest także podlanie roślin.

Podczas sadzenia	wiosną	25-50 g/roślinę, mieszając z 25-50 l ziemi
Pierwszy rok uprawy	IV	20 g/m²
	V	
	VI	
Dalsze lata uprawy	IV	30–35 g/m²
	V	
	VI	

Zasilanie roślin zaleca się zakończyć do połowy czerwca. Nawożenie powtarzać co ok. 4 tygodnie.

Różaneczniki

Podczas sadzenia	wiosną	25-50 g/roślinę, mieszając z 25-50 l ziemi
Pierwszy rok uprawy	III	20 g/roślinę
	IV	
Drugi rok uprawy	III	25 g/roślinę
	IV	
Dalsze lata uprawy	III	30 g/roślinę
	IV	

Nawożenie powtarzać co ok. 4 tygodnie.

Azalie i wrzośce

Podczas sadzenia	wiosną	10 g/roślinę, mieszając z 10 l ziemi
Pierwszy rok uprawy	IV	10 g/roślinę
Drugi rok uprawy	IV	
Dalsze lata uprawy	IV oraz VI-VII	

W uprawie pojemnikowej nie należy przekraczać dawki 1 g nawozu na 1 l podłoża.

Iglaki i paprocie

Rośliny te należy nawozić Florovitem do borówek jeśli gleba jest za mało kwaśna – pH gleby powyżej 6.

Podczas sadzenia	wiosną	10 g/roślinę, mieszając z 10-20 l ziemi
Dalsze lata uprawy	III	• wysokość rośliny < 50 cm – 10 g/roślinę • wysokość rośliny > 50 cm – 20 g/roślinę • wysokość rośliny > 100 cm – 40 g/roślinę • wysokość rośliny > 200 cm – 60 g/roślinę

395 mm

50 mm

25 mm