


**5 g**OTWIERAĆ
TU**DISCUS®**
500 WG**agrecol®**

z apteki ogrodnika

DISCUS® 500 WG**zwalcza
amerykańskiego
mączniaka
na porzeczkach
i agrestie****5 g****■ BASF**
We create chemistry

5 902341 102564



WYBRANE ZASTOSOWANIA

■ BASF
We create chemistry**DISCUS® 500 WG**

ROŚLINA	CHOROBA	DAWKA
porzeczka czarna, p. czerwona, p. biała, agrest	amerykański mączniak agrestu	2 g w 5-7 l wody /100 m²
jabłoń, grusza	parch jabłoni, parch gruszy	2 g w 1,5-10 l wody /100 m²
truskawka	mączniak prawdziwy	3 g w 5-7 l wody /100 m²
rośliny ozdobne (dalia, zawilec, petunia, niecierpek, werbena i inne - w szklarni i pod osłonami)	mączniak prawdziwy	3 g w 2-10 l wody /100 m²
chryzantemy uprawiane w gruncie i pod osłonami	rdza	3 g w 2-10 l wody /100 m²
róże uprawiane w gruncie i pod osłonami	mączniak prawdziwy, czarna plamistość róż	3 g w 3-10 l wody /100 m²
drzewa ozdobne	mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku <i>Cylindrocladium</i> spp.	6 g w 2-10 l wody /100 m²
szkółki drzew i krzewów (dąb, ogień, pigwowiec japoński, bukszpan i inne)	mączniak prawdziwy dębu, rdza, zgnilizna gatunku <i>Cylindrocladium</i> spp.	6 g w 2-10 l wody /100 m²

Płynny tekst etykiety środka dołączony jest do opakowania. Przed użyciem środka należy zapoznać się z jej treścią.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Discus 500 WG jest fungicydem w formie granulatów do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu lokalnie układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie przed chorobami grzybowymi jabłoni, gruszy, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, agrestu, borówki wysokiej, żurawiny, drzew ozdobnych, szkółek drzew i krzewów ozdobnych, uprawianych w gruncie i pod osłonami truskawek, pomidorach, papryce, bakłazanie, chryzantemach i różach, uprawianych w szklarni i pod osłonami roślinach ozdobnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych, samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Zawartość substancji czynnej: krezoksym metylu (związek z grupy strobiluryn) – 500 g/kg (50%).

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:
AGRECOL Sp. z o.o.
98-400 Wieruszów, Meszary 2
tel.: 62 783 20 00
fax: 62 784 44 45
e-mail: agrecol@agrecol.pl
www.agrecol.pl



Uwaga

**Zezwolenie MRiRW nr R-14/2010
z dnia 17.02.2010 r.
ostatnio zmienione decyzją MRiRW
nr R - 634/2019d z dnia 04.09.2019 r.**

Okres ważności: 2 lata.
Data produkcji i nr partii:

**Zawartość
netto: 5 g**

Posiadacz zezwolenia:
BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Republika Federalna Niemiec
tel. +49 621 60-0
fax: +49 621 60-42525
e-mail: info.service@basf.com

Podmiot, wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BASF Polska Sp. z o.o.,
Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa,
tel.: 22 570 99 99,
fax: 22 570 97 92,
e-mail: poczta@basf.com

**PRZESTRZEGAJ ETYKIETY ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W CELU
OGRANICZENIA RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA.**