55 mm | 130 mm | 60 mm | 290 mm | 60 mm | 130 mm | 55 mm

65 mm

440 mm

340 mm

N_026 - worek 10 kg

Wymagania roślin względem odczynu/kwasowości gleby	
odczyn gleby – pH	**Rośliny/grupy roślin**
bardzo kwaśny pH poniżej 5,0	borówki wysokie, żurawiny, różaneczniki, azalie, hortensje niebieskie, wrzosy, wrzośce, kamelie
kwaśny pH 5,1–6,0	truskawki, maliny, agrest, aronia, pomidory, papryka, pelargonie, konwalie, modrzewie, świerki, sosny
obojętny/lekko kwaśny pH 6,1–7,4	pozostałe rośliny

TERMINY STOSOWANIA

Jesień

to najlepszy termin stosowania nawozu (wrzesień – październik) – po zbiorze plonów. Zalecaną dawkę należy rozsiać równomiernie na nawożoną powierzchnię i zmieszać dokładnie z uprawną warstwą gleby.

Wiosna

przed siewem lub sadzeniem roślin (jak najwcześniej wiosną) całą zalecaną dawkę rozsiać równomiernie na nawożoną powierzchnię i zmieszać dokładnie z uprawną warstwą gleby.

Wskazówki

- Nawóz należy stosować co najmniej 2–3 tygodnie przed zastosowaniem innych nawozów.
- Bezpośrednio po wapnowaniu nie należy siać ani sadzić roślin.
- Regularne podlewanie zwiększa efektywność nawożenia.
- Nie należy stosować nawozu pod rośliny kwaśnolubne.
- Wapnowanie gleby pod uprawę takich warzyw jak: dynia, fasola, groch, marchew, ogórek, pasternak, pietruszka, pomidor, seler należy przeprowadzać najpóźniej jesienią w roku poprzedzającym uprawę.

Florovit dolomit mielony

ŚRODEK WAPNUJĄCY PFC 2
Liczba zobojętnienia: min. 48 (ekwiwalent CaO)
Całkowity tlenek wapnia (CaO): 26% (m/m)
Całkowity tlenek magnezu (MgO): 17% (m/m)
Reaktywność: 50% (test kwasu chlorowodorowego)
Składniki: dolomit[1] (CAS 14168-73-1), gdzie [1] oznacza CMC 1 – surowce pierwotne i mieszaniny.
Granulometria: Proszek. 90% produktu przechodzi przez sito 1 mm.

Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Rozsypany nawóz dokładnie zebrać, pozostałość zmyć wodą. W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia człowieka i środowiska należy postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi stosowania.

CE

PRZECHOWYWAĆ W SUCHYM POMIESZCZENIU W ORYGINALNYCH ZAMKNIĘTYCH OPAKOWANIACH.

Data ważności - bezterminowo.

90016vCE01

5 900861 142145

GRUPA INCO

GRUPA INCO S.A.
ul. Wspólna 25, 00-519 Warszawa
Zakład Produkcyjny w Suszu
tel./fax +48 55 242 75 00
florovit.pl

13 12 | 11 10 | 04 LDPE

florovit®

Florovit dolomit mielony to nawóz wapniowo-magnezowy przeznaczony do stosowania na wszystkich rodzajach gleb, szczególnie na glebach ubogich w magnez. Dolomit odkwasza podłoże, wnosi do gleby magnez i mikroelementy oraz poprawia jakość plonów. Magnez ułatwia roślinom pobieranie fosforu i korzystnie wpływa na szereg procesów metabolicznych. Z uwagi na duży stopień rozdrobnienia szybko przechodzi do roztworu glebowego i jest łatwo przyswajalny przez rośliny.

Dolomit odkwasza glebę przez co podnosi jej urodzajność:

- poprawia strukturę gleby,
- zwiększa przyswajalność składników pokarmowych,
- ogranicza przyswajanie przez rośliny metali ciężkich,
- poprawia jakość plonów,
- przeciwdziała chlorozie.

SPOSÓB STOSOWANIA

Dawki stosowania

Stosować w dawce 0,8–2,1 kg na 10 m² w zależności od odczynu gleby oraz jej zasobności w magnez wg tabeli.

Pełna szklanka zawiera ok. 330 g nawozu.

Zalecane dawki w kg/10 m²

Zawartość magnezu w glebie	Przygotowanie stanowiska pod rośliny jednoroczne na glebach				Rośliny wieloletnie	Trawniki
	bardzo lekkich	lekkich	średnich	ciężkich		
bardzo niska	1	1,3	1,6	2,1	1,6	1,6
niska	0,8	1	1,3	1,8	1	1

Zalecane dawki nawozu mogą nie regulować w pełni odczynu gleby, na której wapnowanie jest konieczne. W wypadku utrzymania się kwaśnego odczynu należy dodatkowo glebę zwapnować w ilościach wynikających z odczynu gleby.

masa netto 10 kg

35 mm

46 mm | 8 mm | 8 mm | 45 mm

780 mm