



NAWÓZ DO IGLAKÓW PRZECIWKO BRĄZOWIENIU IGIEŁ



ODPOWIEDNIO ODŻYWIONE ROŚLINY, PRAWIDŁOWY ROZWÓJ ROŚLIN, OPTYMALNY SKŁAD
ZAŁĄCZONA MIARKA ZAPEWNIĄ PRECYZYJNE DAWKOWANIE

Instrukcja i dawki:

CHARAKTERYSTYKA NAWOZU:

Nawóz TARGET do iglaków przeciwko brązowieniu igieł jest specjalnie przygotowanym nawozem dla tej grupy roślin, zawierającym dodatkowo oprócz azotu, potasu i fosforu także magnez, który wpływa na soczystość zielone wybarwienie igieł.

TERMIN STOSOWANIA:

Od marca do lipca co 3-4 tygodnie.

ZALECANE TERMINY STOSOWANIA:



■ najlepszy termin ■ nie stosować

DAWKI:

W zależności od wielkości krzewu 25-100 g na krzew lub na 1 m² podłoża, krzewy powyżej 1,5 metra - 50-100 g na każdy metr wysokości krzewu (w opakowaniu znajduje się miarka z dwoma poziomami: 25 g i 50 g).

SPOSÓB STOSOWANIA:



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:

Powyższe zalecenia dot. nawożenia są ogólne i odnoszą się do średniej wielkości okazów roślin. Częstotliwość stosowania oraz dawka nawozu powinny być zawsze dobrane do indywidualnych potrzeb rośliny oraz warunków uprawy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za działania użytkownika będące naruszeniem zasad dobrej praktyki uprawy roślin.

- Nie jeść i nie pijać nawozu.
- W przypadku dostania się nawozu do oka - przemyć oko obficie czystą wodą.
- Stosować rękawice ochronne.
- Nie wrzucać do zlewu, kanalizacji i systemów drenażowych.
- Nawozy stosować w sposób rozważny, a nawożenie powinno wynikać z potrzeb rośliny i zasobności podłoża.
- W przypadku dostania się nawozu na powierzchnię nieprzeznaczone do nawożenia (np. kostka brukowa, kamienie, zębki użyte do ściółkowania itp.) należy niezwłocznie zebrać nawóz - niebezpieczeństwo wystąpienia przebarwień.

INFORMACJE DODATKOWE:

Rośliny iglaste dobrze rosną zarówno na stanowiskach słonecznych jak i zacienionych. Podłoże powinno być żyzne i przepuszczalne, składające się z mieszanki torfu niskiego i wysokiego oraz kompostu korowego. Iglaki powinny być podlewane dogłębowo, co pozwoli roślinie uzupełnić ilość płynów oraz zapobiegnie chorobom grzybowym. Należy pamiętać o podlewaniu roślin jesienią. Rośliny iglaste wymagają cięcia. Pierwszym terminem cięcia jest wiosna, wtedy wycinamy pędy uszkodzone przez mróz, odkształcone i naderwane przez śnieg. Cięcie w okresie letnim to cięcie formujące. Należy unikać cięcia po sierpniu, gdyż pędy mogą przemarzać. Nawożenie organiczne i mineralne rozpoczynamy wiosną i kontynuujemy do lipca. Iglaki nawożymy trzy do czterech razy w sezonie, w odstępach comiesięcznych. Brązowienie igieł może być spowodowane przez wiele przyczyn innych niż braki składników pokarmowych: choroby, szkodniki, brak wody, przenawożenie itd.

Producent:

TARGET S.A.
Kartoszyń, ul. Przemysłowa 5,
84-110 Krokowa
tel. 58 774 10 90,
fax: 58 676 74 89
e-mail: info@target.com.pl

data produkcji i numer partii:



Masa netto:

1 kg e

TARGET.COM.PL sposób na zadbane ogród

NAWÓZ DO IGLAKÓW PRZECIWKO BRĄZOWIENIU IGIEŁ

Inne produkty
przydatne w uprawie
iglaków:



Emulpar 940 EC
chroni przed pozimowym
brązowieniem,
zwalcza szkodniki



Mospilan 20 SP
preparat zwalczający
szkodniki roślin



Gotowe Podłoże
do iglaków



NAWÓZ DO IGLAKÓW

OTT190TX/KZ09



**STALY NIEORGANICZNY
NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY
(PFC 1(C)(I)(a))i**
**NPK (Mg) nawóz zawierający
mikrośladowki pokarmowe,
9,5-7-13 (+3)**

9,5 % (m/m) **CAŁKOWITEGO
AZOTU (N)**
9,5 % (m/m) azotu amonowego
7,0 % (m/m) **CAŁKOWITEGO
PIĘCIOTLENKU FOSFORU (P₂O₅)**
13,0 % (m/m) **CAŁKOWITEGO
TLENKU POTASU (K₂O)**
3,0 % (m/m) **CAŁKOWITEGO
TLENKU MAGNEZU (MgO)**
0,01 % (m/m) boru (B) w postaci
kwasu, rozpuszczalny w wodzie
0,02 % (m/m) żelaza (Fe) w postaci
siarczanu, rozpuszczalne w wodzie

Składniki:

- siarczan amonu (CMC1)
nr CAS 7783-20-2,
- fosforan dwuamonowy (CMC1)
nr CAS 7783-28-0,
- chlorek potasu (CMC1)
nr CAS 7447-40-7,
- siarczan magnezu (CMC1)
nr CAS: 7487-88-9,
- bor w postaci kwasu (CMC1)
nr CAS 10043-35-3,
- żelazo w postaci siarczanu (CMC1)
nr CAS 17375-41-6
CMC1 - Pierwotne surowce i mieszaniny

Zalecane warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym, nienastło-
necznym i chłodnym miejscu,
z dala od dzieci.

Granulometria: Granule.
95% produktu ma postać granu-
lu o wymiarach 2,0 – 6,0 mm.

Data produkcji: na opakowaniu

Okres przydatności do stosowania:
bezterminowo

**W przedsiębiorstwie wdrożono
system zarządzania jakością
ISO 9001**



SPRAWDŹ

NAWÓZ DO IGLAKÓW PRZECIWKO BRĄZOWIENIU IGIEŁ

- ODPOWIEDNIO ODŻYWIONE ROŚLINY
- PRAWIDŁOWY ROZWÓJ ROŚLIN
- OPTYMALNY SKŁAD



Multi-Druk Sp. z o.o.
Kartoszyń
ul. Przemysłowa 7
84-110 Krokowa
NIP 587-14-66-773
www.multi-druk.pl
tel./fax: +48 (58) 774 10 92